Phasenübergänge und kritische Phänomene

Owe Philipsen

Goethe-Universität Frankfurt am Main – Sommersemester 2025

Version: 11. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Erinnerung Thermodynamik + Statistische Physik	4
1.1	Thermodynamische Begriffe	4
1.2	Hauptsätze der Thermodynamik	5
1.3	Thermodynamische Potenziale	5
1.4	Abhängigkeit von der Teilchenzahl	7
1.5	Bedingungen für Gleichgewicht und Stabilität	9
1.6	Phasengleichgewicht und Phasendiagramme	10
1.7	Thermodynamische Beschreibung von Phasenübergängen	12
1.8	Kritische Endpunkte	15
1.9	Van der Waals-Zustandsgleichung und Flüssig-Gas-Übergang	18
1.10	Quantenstatistische Mechanik	22
1.11	Phasenübergänge aus der Zustandssumme	25
2	Einige Spinmodelle	29
2.1	Das Ising Modell	29
2.2	Äquivalenz des Ising-Modells mit anderen Modellen	31
2.3	Verallgemeinerungen des Ising-Modells	32
2.4	Potts-Modelle	33
2.5	XY- und Heisenberg-Modelle	33
3	Das Ising-Modell	34
3.1	Symmetrien	34
3.2	Existenz von Phasenübergängen	35
3.2.1	$T = 0$	35
3.2.2	$T \neq 0, d = 1$	35
3.2.3	$T \neq 0, d = 2$	36
3.2.4	Unmöglichkeit von Phasenübergängen in endlichem Volumen	37
3.3	Spontane Symmetriebrechung	37
3.4	Ausblick: Kontinuierliche Systeme	39
3.5	Lösung des Ising-Modells in $d = 1$	40
3.6	Lösung über die Transfermatrix	41
3.7	Phasenübergang gemäß der exakten Lösung	43
3.8	Thermodynamische Eigenschaften	44
3.9	Räumliche Korrelationen	45
3.9.1	Korrelationsfunktion mit Ad Hoc Methode	45
3.9.2	Korrelationsfunktion über die Transfermatrix	47
3.10	Verallgemeinerung der Transfermatrix	48
4	Kritische Phänomene	50
4.1	Phänomenologie	50
4.2	Potenzgesetze und Reskalierung	53
4.3	Korrelationsfunktion und Fluktuations-Dissipations-Theorem	54

4.4	Die Skalierungshypothese	55
5	Mean-Field-Theorie und Landau-Theorie	58
5.1	Mean-Field-Theorie für das Ising-Modell	58
5.2	Mean-Field-Theorie für Flüssig-Gas-Übergang	61
5.3	Gemeinsamkeiten von Mean Field Theorien	65
5.4	Landau-Theorie	66
5.4.1	Phasenübergänge 2. Ordnung	66
5.4.2	Phasenübergänge 1. Ordnung	68
5.4.3	Landau-Theorie für trikritische Punkte	70
5.5	Inhomogene Systeme und Blockspins	73
5.6	Interpretation der Landau freien Energie	75
5.7	Erinnerung Funktionalableitung:	77
5.8	Fluktuationen und Korrelationen	78
5.9	Berechnung der Korrelationsfunktion	79
5.10	Gültigkeit der Landau-Theorie: Ginzburg-Kriterium	81
5.11	Funktionalintegrale	83
5.12	Landau freie Energie aus der Hamiltonfunktion	86
5.13	Das Gauß-Modell oder die Gauß-Näherung	88
6	Die Renormierungsgruppe	91
6.1	Blockspin-Transformationen	91
6.2	Blockspintrafo im 1d Ising-Modell	93
6.3	Renormierungsgruppentransformationen	95
6.4	Fixpunkte und skalierende Felder	97
6.5	Skalierungsverhalten und kritische Exponenten	99
6.6	RG-Gleichungen in differentieller Form	100
6.7	Formulierung für kontinuierliche Systeme	101
6.8	Anwendung auf das Gauß-Modell	103

Phasenübergänge:

- Historisches Gebiet der Physik: Erscheinungsformen der Materie
- Modernes Gebiet der Physik: kritische Phänomene
- Vertreten in allen Disziplinen der Physik:
kondensierte Materie, Teilchenphysik, Kosmologie
- Vollständige Beschreibung: Quantenfeldtheorie und Renormierungsgruppe

Phasen:

- Zustandsformen desselben Stoffs, abhängig von äußeren Bedingungen
- Makroskopische Observable, durch deren unterschiedliche Werte sich Phasen unterscheiden, heißen Ordnungsparameter; Beispiele:
 1. Dichte: Gas, Flüssigkeit, Festkörper
 2. Magnetisierung: Para-, Ferro-, Antiferromagnet
 3. El. Dipolmoment: Paraelektrikum, Ferroelektrikum
 4. El. Leitfähigkeit: Isolator, Metall, Supraleiter
 5. Viskosität: Flüssigkeit, Supraflüssigkeit
 6. Kristallstruktur: Festkörper
 7. Vakuumstruktur: QFT
- Phasenübergänge: Wechsel zwischen Zustandsformen eines Stoffes in sogenannten kritischen Bereichen thermodynamischer Variablen wie $T, P, \vec{H}$ etc.

1 Erinnerung Thermodynamik + Statistische Physik

1.1 Thermodynamische Begriffe

- Thermodynamisches System: makroskopisch, Teilchenzahl $N \sim 10^{23}$
- Zustandsgrößen, thermodynamische Parameter: $P, V, T, \mathbf{H}, \mathbf{M}, \dots$
experimentell definiert, systemabhängig
- thermodynamisches Gleichgewicht: thermodynamischer Zustand ändert sich nicht (mehr) mit der Zeit
- Zustandsgleichung: Beziehung zwischen Zustandsgrößen, z.B. $f(P, T, V) = 0$
- mechanische Arbeit: $dW = PdV$ (Gase, Flüssigkeiten),
 $dW = -\mathbf{H} \cdot d\mathbf{M}$ (Magnete)

- Wärmemenge. $\Delta Q = C\Delta T$ wird absorbiert, wenn T steigt ohne dass Arbeit verrichtet wird; C spezifische Wärme, stoffabhängig
- Temperatur T : definierte Größe, z.B. durch ideales Gas, $PV = Nk_B T$
- Extensive/intensive Zustandsgrößen: proportional zu/unabhängig von Substanzmenge
- Entropie: $\Delta S = \Delta Q/T$ bei reversibler Zustandsänderung

1.2 Hauptsätze der Thermodynamik

1.HS: Für beliebige Zustandsänderungen zwischen gegebenen Zuständen A, B ist

$$dE = dQ - dW, \quad \int_A^B dE \quad \text{wegunabhängig} \quad (1.1)$$

dW, dQ sind *keine* vollständigen Differenziale, dE innere Energie des Systems, extensiv

2.HS Für beliebige Zustandsänderungen ist

$$dQ \leq TdS \quad \text{Gibbs'sche Formulierung}$$

$$\int_A^B dS \geq \int_A^B \frac{dQ}{T} \quad (1.2)$$

Gleichheitszeichen gilt bei reversiblen Prozessen

Für isolierte Systeme ist $dQ = 0 \Rightarrow S(B) - S(A) \geq 0$

$\Rightarrow$ Irreversible Prozesse vergrößern die Entropie von isolierten Systemen

$\Rightarrow$ Gleichgewichtszustand eines isolierten Systems hat maximale Entropie

Zusammen mit 1.HS:

$$TdS \geq dE + dW \quad (1.3)$$

1.3 Thermodynamische Potentiale

Reversibler Prozess: $dE = TdS - PdV, \Rightarrow E = E(V, S)$

Verallgemeinerung: erlaube Teilchenaustausch zwischen System und Umgebung

$$dE = TdS - PdV + \sum_i \mu_i N_i, \quad E = E(S, V, N_i) \quad (1.4)$$

N_i Teilchenzahl der Teilchensorte i , μ_i chemische Potentiale

Andere thermodynamische Potentiale durch Legendre-Trafo:

Helmholtz freie Energie:

$$\begin{aligned} F &= E - TS \\ dF &= TdS - PdV + \sum_i \mu_i dN_i \\ F &= F(V, T, N_i) \end{aligned} \quad (1.5)$$

Bei isothermer Zustandsänderung und fester Teilchenzahl ist F gleich dem Negativen der maximal durch das System verrichteten Arbeit:

$$\Delta W \leq -\Delta E + T\Delta S = -\Delta F \quad (1.6)$$

Für ein mechanisch isoliertes System bei konstanter Temperatur ist der Gleichgewichtszustand der Zustand mit minimaler Helmholtz freier Energie

Gibbs freie Energie (freie Enthalpie):

$$\begin{aligned} G &= F + PV \\ dG &= -PdV + \sum_i \mu_i dN_i - SdT + VdP \end{aligned} \quad (1.7)$$

$$G = G(P, T, N_i) \quad (1.8)$$

Für ein mechanisch isoliertes System bei konstantem Druck ist der Gleichgewichtszustand der Zustand mit minimaler Helmholtz freier Energie

Magnetische Systeme:

Modelliert durch magnetische Momente (Spins) auf Gitterplätzen, die sich in äußeren Feldern ausrichten (kein Teilchenaustausch!)

Arbeit $dW = -\mathbf{H} \cdot d\mathbf{M}$

$$\begin{aligned} G(\mathbf{H}, T) &= E(S, \mathbf{M}) - TS - \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} \\ dG &= -SdT - \mathbf{M} \cdot d\mathbf{H} \\ &\text{etc.} \end{aligned} \quad (1.9)$$

Maxwell-Relationen:

Betrachte freie Energie eines 1-komponentigen PVT -Systems:

$$dF = -SdT + PdV + \mu dN \quad (1.10)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{N,V} = -S, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{N,T} = -P, \quad \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = \mu \quad (1.11)$$

Für eindeutige, mindestens zweimal stetig differenzierbare Funktionen $f(x, y)$ ist die Reihenfolge der partiellen Ableitungen gleichgültig,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \quad (1.12)$$

Daraus folgen die Maxwell-Relationen:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{N,V} \\ \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{V,T} &= -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{N,V} \\ \left(\frac{\partial P}{\partial N}\right)_{V,T} &= -\left(\frac{\partial \mu}{\partial V}\right)_{T,N} \end{aligned} \quad (1.13)$$

Antwortfunktionen:

Beschreiben die Reaktion eines Systems auf Änderung äußerer Parameter; entsprechen 2. Ableitungen thermodynamischer Potenziale

Bsp. 1-komponentiges *PVT*-System:

$$\text{spez. Wärme } C_V = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = T \left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V \quad (1.14)$$

$$C_P = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_P \quad (1.15)$$

$$\text{spez. Kompressibilität } \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2}\right)_T \quad (1.16)$$

$$\text{therm. Expansionskoeffizient } \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,N} = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T\right)_P \quad (1.17)$$

1.4 Abhängigkeit von der Teilchenzahl

E, S, F, G additiv/extensiv; T, P intensiv

Annahme (o.B.d.A): System besteht nur aus einer Teilchensorte

Additivität: bei Änderung der Materiemenge (Teilchenzahl N) um einen Faktor α ändert sich eine additive Größe um denselben Faktor

$\Rightarrow$ homogene Funktionen ersten Grades bezüglich der additiven Variablen

Bsp: $E = E(S, V)$; E additiv, S, V additiv

$$\Rightarrow E(S, V) = \alpha f\left(\frac{S}{\alpha}, \frac{V}{\alpha}\right) \quad (1.18)$$

Für $V = \alpha V'$ ist $S = \alpha S'$ und $E = \alpha E'$

Sei $\alpha = \frac{N}{N'}$, mit N' als fester Bezugsgröße, $N' = 1$

$$\Rightarrow E(S, V, N) = Nf\left(\frac{S}{N}, \frac{V}{N}\right)$$

Alternative Form: $E(\alpha S, \alpha V) = \alpha E(S, V)$

Analog (mit jeweils einer anderen Funktion f):

$$\text{freie Energie: } F(N, V, T) = Nf\left(\frac{V}{N}, T\right) \quad (1.19)$$

$$\text{freie Enthalpie: } G(N, P, T) = Nf(P, T) \quad (1.20)$$

Wegen $dE = TdS - PdV + \mu dN$ ist

$$\mu \equiv \left(\frac{\partial E}{\partial N}\right)_{S,V} \quad \text{chemisches Potenzial} \quad (1.21)$$

Entsprechend:

$$dF = -SdT - PdV + \mu dN \quad (1.22)$$

$$dG = -SdT + VdP + \mu dN \quad (1.23)$$

Dann gilt auch:

$$\Rightarrow \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} \quad (1.24)$$

Physikalische Bedeutung von μ aus (1.20) :

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} = f(P, T) = \frac{G}{N} \quad (1.25)$$

Das chemische Potenzial entspricht der freien Enthalpie pro Teilchen $\Rightarrow$ als Funktion von P, T unabhängig von N

$$\Rightarrow \text{Gibbs-Duhem-Relation } d\mu = -sdT + vdP, \quad s = \frac{S}{N}, v = \frac{V}{N} \quad (1.26)$$

Thermodynamisches Potenzial mit unabhängiger Variable μ :

$$d(\mu N) = \mu dN + Nd\mu \quad (1.27)$$

$$\Rightarrow d(F - \mu N) = -SdT - PdV - Nd\mu \quad (1.28)$$

Def:

$$\Omega \equiv F - \mu N = F - G = E - TS - (E + PV - TS) = -PV \quad (1.29)$$

$$\Rightarrow \Omega(V, T, \mu), \quad d\Omega = -SdT - Nd\mu - PdV \quad (1.30)$$

$$\Rightarrow N = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial\mu}\right)_{T,V} = V\left(\frac{\partial P}{\partial\mu}\right)_{T,V} \quad (1.31)$$

N entspricht jetzt der mittleren Teilchenzahl in V bei T , gemittelte Größe!

$$S = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial T}\right)_{V,\mu}, \quad P = -\left(\frac{\partial\Omega}{\partial V}\right)_{T,\mu} \quad (1.32)$$

Für irreversible Prozesse:

$$dE + PdV - \mu dN < TdS \quad (1.33)$$

$$dE + PdV - \mu dN - TdS < 0 \quad (1.34)$$

Prozesse mit T, V, μ konst:

$$d(E - TS - \mu N) = d(F - \mu N) = d\Omega < 0 \quad (1.35)$$

Das thermodynamische Potenzial Ω ist im Gleichgewicht bezüglich Zustandsänderungen mit festem T, V, μ minimal

1.5 Bedingungen für Gleichgewicht und Stabilität

Gegeben seien zwei PVT -Systeme $(E_1, V_1; E_2, V_2)$ in thermischem Kontakt und thermodynamischem Gleichgewicht mit $E = E_1 + E_2$, $V = V_1 + V_2$ fest

Gesamtentropie: $S = S_1(E_1, V_1) + S_2(E_2, V_2) \Rightarrow$ Maximum!

$$\begin{aligned} dS &= \left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1}\right)_{V_1} dE_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_2}\right)_{V_2} dE_2 + \left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1}\right)_{E_1} dV_1 + \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_2}\right)_{E_2} dV_2 \\ &= \left[\left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1}\right)_{V_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_2}\right)_{V_2} \right] dE_1 + \left[\left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1}\right)_{E_1} - \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_2}\right)_{E_2} \right] dV_1 \\ &\stackrel{!}{=} 0 \end{aligned} \quad (1.36)$$

Wegen $dE_i = T_i dS_i - P_i dV_i$ ist dann

$$dV_1 = 0 : \quad \left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1}\right)_{V_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial E_2}\right)_{V_2} \Leftrightarrow \frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2} \quad (1.37)$$

$$dE_1 = 0 : \quad \left(\frac{\partial S_1}{\partial V_1}\right)_{E_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial V_2}\right)_{E_2} \Leftrightarrow \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (1.38)$$

oder

$$T_1 = T_2 \quad P_1 = P_2 \quad (1.39)$$

Falls zusätzlich Teilchenaustausch zwischen den Untersystemen (1 Sorte)

$$\mu_1 = \mu_2 \quad (1.40)$$

1.6 Phasengleichgewicht und Phasendiagramme

Gegeben sei ein System aus einem Stoff, z. B. PVT -System, Stoffmenge N

Gleichgewichtszustand durch zwei beliebige thermodyn. Variablen bestimmt

Aber: Zustand muss nicht homogen sein, kann in zwei sich berührende homogene Teilsysteme zerfallen $\Rightarrow$ Phasen

Bedingungen für zwei Phasen im Gleichgewicht ($\hat{=}$ Untersysteme):

$$T_1 = T_2, \quad P_1 = P_2, \quad \mu_1 = \mu_2$$

Wähle P, T als Variable

$\Rightarrow \mu_1(P, T) = \mu_2(P, T)$ im Phasengleichgewicht

$\Rightarrow$ Phasengleichgewicht ist nicht für beliebiges P, T möglich!

Vorgabe der einen Variablen bestimmt die andere; $\Rightarrow$ 1 Gleichung, 2 Unbekannte

$\Rightarrow$ Koexistenzkurve im PT -Diagramm

TV-Diagramm:

Gleichgewicht dreier Phasen:

$$P_1 = P_2 = P_3 ; T_1 = T_2 = T_3 ; \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$\Rightarrow \mu_1(P, T) = \mu_2(P, T) = \mu_3(P, T)$$

$\Rightarrow$ 2 Gl. 2 Unbekannte $\Rightarrow$ Lsg. einzelne Wertepaare (P_t, T_t) Tripelpunkte

$\hat{=}$ Schnittpunkte von Koexistenzkurven von jeweils zwei der drei Phasen

Volumina der Phasen im Tripelpunkt

$\nexists$ Phasengleichheit von mehr als drei Phasen in einkomponentigem System!

1.7 Thermodynamische Beschreibung von Phasenübergängen

Betrachte einkomponentigen Stoff, Übergang zwischen I und II , z..B. Flüssig-Gas

Phasengleichgewicht: $P = \text{konst.}$, $T = \text{konst.}$, $V \neq \text{konst.}$

$\Rightarrow$ isotherme Zustandsänderung bei $P = \text{konst.}$

Wärmeaufnahme oder- abgabe = Übergangswärme oder latente Wärme

$$\Delta S = \int_2^1 \frac{dQ_{rev}}{T} \Rightarrow S_1 - S_2 = \frac{\Delta Q}{T} \quad (1.41)$$

Beachte: Der Übergang ist vollständig durch die Zustände 1,2 festgelegt

$$1 : s_1 = \frac{S_1}{N}, \quad v_1 = \frac{V_1}{N} \quad (1.42)$$

$$2 : s_2 = \frac{S_2}{N}, \quad v_2 = \frac{V_2}{N} \quad (1.43)$$

Alle Zustände dazwischen sind Linearkombinationen von diesen

Übergangswärme pro Teilchen: $q = T(s_1 - s_2)$

Chemische Potentiale zweier Phasen bei festem Druck:

$$\mu = \frac{G}{N}, \quad G \text{ minimal im thermischen Gleichgewicht} \quad (1.44)$$

$T < T_c$: Phase *II* stabil (*I* metastabil)

$T > T_c$: Phase *I* stabil (*II* metastabil)

Phasengleichgewicht: $\mu_1 = \mu_2$

Wegen

$$d\mu = -s dT + v dP \quad (1.45)$$

ist Im Schnittpunkt

$$\underbrace{\frac{\partial \mu_2}{\partial T} \Big|_{T_c}}_{-s_2} > \underbrace{\frac{\partial \mu_1}{\partial T} \Big|_{T_c}}_{-s_1} \Rightarrow s_1 - s_2 = \frac{q}{T} > 0 \quad (1.46)$$

⇒ Bei Temperaturerhöhung geht das System von einer Phase in eine andere über und absorbiert dabei Wärme. Die erste Ableitung eines thermodynamischen Potentials springt bei T_c ≐ Phasenübergang 1. Ordnung

Klassifikation nach Ehrenfest: Phasenübergang n -ter Ordnung ist charakterisiert durch einen Sprung in der n -ten Ableitung eines thermodynamischen Potentials

Moderne Klassifikation: Nur noch 1. oder 2. Ordnung, d.h. mit Sprung in entweder der ersten oder höheren Ableitungen

(Grund: Divergenzen statt Sprünge in höherer Ordnung, vgl. nächster Abschnitt); Insbesondere entspricht der Ordnungsparameter meist einer ersten Ableitung eines thermodynamischen Potentials

Entlang der Koexistenzkurve ist $\mu_1(P, T) = \mu_2(P, T)$

Differenzieren nach T ergibt

$$\left(\frac{\partial\mu_1}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial\mu_1}{\partial P}\right)_T \frac{dP}{dT} = \left(\frac{\partial\mu_2}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial\mu_2}{\partial P}\right)_T \frac{dP}{dT} \quad (1.47)$$

Aus (1.26) haben wir

$$\left(\frac{\partial\mu}{\partial P}\right)_T = v, \quad \left(\frac{\partial\mu}{\partial T}\right)_P = -s \quad (1.48)$$

und damit folgt die Clausius-Clapeyron-Gleichung

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{s_1 - s_2}{v_1 - v_2} = \frac{q}{T(v_1 - v_2)}} \quad (1.49)$$

Analog für andere unabhängige Variablen:

$$P_1(\mu, T) = P_2(\mu, T) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dT}{d\mu} = -\frac{\left(\frac{N}{V}\right)_1 - \left(\frac{N}{V}\right)_2}{\left(\frac{S}{V}\right)_1 - \left(\frac{S}{V}\right)_2}} \quad (1.50)$$

$$T_1(P, \mu) = T_2(P, \mu) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dP}{d\mu} = \frac{s_1^{-1} - s_2^{-1}}{\left(\frac{V}{S}\right)_1 - \left(\frac{V}{S}\right)_2}} \quad (1.51)$$

Die Clausius-Clapeyron-Gleichungen machen Aussagen über die Steigungen der Koexistenzkurven

Schlussfolgerung für $T \rightarrow 0$:

$$s_1, s_2 \rightarrow 0 \text{ (3.HS)} \quad \Rightarrow \quad \frac{dT}{d\mu} \rightarrow \infty$$

$\Rightarrow$ Koexistenzkurve trifft senkrecht auf μ -Achse

1.8 Kritische Endpunkte

Endpunkt einer Koexistenzkurve
für das Phasengleichgewicht

für $T > T_c, P > P_c$ keine Koexistenz von Phasen, System homogen

Achtung: Falls krit. Punkt existiert, verliert der Begriff der Phasen strenggenommen seine Gültigkeit:

2 beliebige Zustände lassen sich immer durch einen kontinuierlichen Übergang verbinden, ohne Trennung in 2 Phasen

⇒ Phasen nur entlang Koexistenzlinie

Wann kann ein kritischer Endpunkt auftreten?

⇒ Nur für Phasen, die sich lediglich quantitativ unterscheiden

Beispiel: Flüssigkeit- Gas, gradueller Unterschied in Dichte und Wechselwirkung

Im Gegensatz dazu:

Phasen, die sich durch innere Symmetrie unterscheiden

Beispiel: flüssig - kristallin, verschiedene Kristallformen, Quantenfeldtheorien mit verschiedenen Vakuumsymmetrien

Symmetrie ist entweder da oder nicht da ⇒ sprunghafter Unterschied zwischen Phasen, kein gradueller;

⇒ ein Zustand kann immer einer Phase zugeordnet werden

⇒ Grenzcurve zwischen Phasen geht entweder ins Unendliche oder schneidet andere Grenzkurven

Isothermen nahe einem kritischen Endpunkt:

Betrachte Kurvenabschnitte::

abc Isotherme in der Flüssigkeit

def Isotherme im Gas

c, crit, d : $(\frac{\partial P}{\partial V})_T = 0$

Betrachte $P \lesssim P_{crit}$, Annäherung an kritischen Punkt;

Volumina der Phasen: $V, V + \delta V$

Phasengleichgewicht: $P(V, T) = P(V + \delta V, T)$

$$\Rightarrow \cancel{P(V, T)} = \cancel{P(V, T)} + \frac{\partial P}{\partial V} \delta V + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \delta V^2 + \dots \quad (1.52)$$

$$\frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \delta V \quad (1.53)$$

Für $\delta V \rightarrow 0$ muss gelten: $(\frac{\partial P}{\partial V})_T = 0$

⇒ verletzt thermodynamische Ungleichung $(\frac{\partial P}{\partial V})_T < 0$

⇒ singulärer Punkt für thermodynamische Funktionen (es treten Divergenzen auf!)

Beispiel mit allen besprochenen Phänomenen:

<https://www.ck12.org/user:chem12-22/book/chemistry-12-22/r76/section/12.6/>

1.9 Van der Waals-Zustandsgleichung und Flüssig-Gas-Übergang

Beachte: Keine Phasenkoexistenz in idealen Gasen, $P_0 V_0 = NT$
 (Ausnahme: Bose-Einstein-Kondensation, Phasenkoexistenz im Impulsraum)

Grund

physikalisch: keine Wechselwirkung

mathematisch: keine Singularitäten in thermodynamischen Potenzialen

⇒ Verbesserung ideale Gasgleichung durch

a) attraktives Potenzial zwischen Teilchen (Bindungszustände)

b) repulsives Potenzial bei kurzen Abständen (keine Überlappung von Teilchen)

Qualitativ:

b) ⇒ Reduktion des zur Verfügung stehenden Volumens

Näherung: Billardkugeln ⇒ $V_0 = V - Nb$

a) ⇒ Reduktion des Drucks

Druckreduktion ~ Anzahl Teilchenpaare mit WW-Abstand r_0 :

$$\sim N \cdot \frac{r_0^3}{V} (N-1) \frac{r_0^3}{V} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \text{konst.} \left(\frac{N}{V}\right)^2 \quad (1.54)$$

$$\Rightarrow P = P_0 - \frac{aN^2}{V^2}$$

⇒ Van-der-Waals-Zustandsgleichung

$$\boxed{(V - Nb) \left(P + \frac{aN^2}{V^2} \right) = NT} \quad (1.55)$$

mit a, b Materialkonstanten

Isothermen:

Achtung: Segmente mit $\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T > 0$ unphysikalisch!
(Wir haben implizit Homogenität ausgenommen)

Gibt es stattdessen ein Phasengleichgewicht?

Die Maxwell-Konstruktion:

Betrachte eine Isotherme mit unphysikalischem Abschnitt:

Minimiere $F!$

entlang Isotherme:

$$dF = -PdV$$

$$\Rightarrow F = - \int_{T=\text{konst.}} PdV$$

a: entlang Kurve, homogenes System

b: entlang Horizontale, 2-Phasensystem

Der Gleichgewichtszustand ist derjenige mit kleinerer freier Energie $\Rightarrow b$

$\Rightarrow$ Zerfall in 2 Phasen zwischen V_1, V_2

$\Rightarrow$ Phasenübergang erster Ordnung zwischen V_1 und V_2 , $P = \text{konst}$

Wo genau liegt die Horizontale?

$$P_1 = P_2 \Leftrightarrow - \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_1 = - \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_2 \quad \text{homogene Kurve (1.56)}$$

$$\text{gemeinsame Tangente in 1: } \frac{F_2 - F_1}{V_2 - V_1} = \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_1 \quad \text{2-Phasenkurve (1.57)}$$

$$-\left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_1 (V_2 - V_1) = -(F_2 - F_1) \quad (1.58)$$

$$P_1(V_2 - V_1) = \int_1^2 P dV \quad (1.59)$$

⇒ Die Bereiche A,B nehmen die gleiche Fläche ein

Kritische Parameter:

Am kritischen Punkt ist

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_{T_c} = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right)_{T_c} = 0 \quad \text{Wendepunkt} \quad (1.60)$$

$$P = \frac{NT}{V - Nb} - \frac{aN^2}{V^2} \quad (1.61)$$

$$P' = -\frac{NT_c}{(V_c - Nb)^2} + \frac{2aN^2}{V_c^3} = 0 \quad (1.62)$$

$$P'' = +2\frac{NT_c}{(V_c - Nb)^3} - \frac{6aN^2}{V_c^4} = 0 \quad (1.63)$$

$\frac{2}{(V_c - Nb)}P' + P'' :$

$$\frac{2}{V_c - Nb} \frac{2aN^2}{V_c^3} - \frac{6aN^2}{V_c^4} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 4V_c - 6(V_c - Nb) = 0 \quad (1.64)$$

$$\boxed{V_c = 3bN, \quad T_c = \frac{8a}{27b}, \quad P_c = \frac{a}{27b^2}} \quad (1.65)$$

⇒ Durch Messen eines Paares aus P_c, T_c, V_c können a, b festgelegt werden

Def Reduzierte Parameter:

$$p \equiv \frac{P}{P_c}, \quad t \equiv \frac{T}{T_c}, \quad v \equiv \frac{V}{V_c} \quad (1.66)$$

⇒ Zustandsgleichung:

$$\left(p + \frac{3}{v^2}\right)\left(v - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}t \quad (1.67)$$

Gesetz der korrespondierenden Zustände:

Zustandsgleichung unabhängig von Materialparametern a, b ⇒ gilt für alle Substanzen, für die das van-der-Waals Modell korrekt ist ⇒ Universalität

1.10 Quantenstatistische Mechanik

Statistische Physik: Erklärung Thermodynamik aus mikroskopischer Physik

Isoliertes System, mikrokanonisches Ensemble

(streng genommen nicht existent in QM, nur approximativ):

Sei $\{\psi_n(q)\}$ eine Basis (meist Energiebasis)

(n : Gesamtheit der Quantenzahlen, q : Gesamtheit der Koordinaten)

Beliebiger Zustand, vollständige Beschreibung:

$$\Psi(t, q) = \sum_n c_n(t) \psi_n(q), \quad \psi_n(q) \text{ stationäre Wellenfkt.} \quad (1.68)$$

Wahrscheinlichkeit für Zustand n : $|c_n|^2$

1. Postulat gleicher Wahrscheinlichkeiten bei fester Energie:

$$|c_n|^2 = \begin{cases} C & E < E_n < E + \Delta E \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad (1.69)$$

2. Postulat zufälliger Phasen (Random Phase Approximation, RPA):

Phasen der komplexen Zahlen c_n sind Zufallszahlen, d.h. Erwartungswert einer Observablen f in diesem Zustand:

$$\langle f \rangle = \frac{\langle \Psi | \hat{f} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle} = \int dq \Psi^* \hat{f} \Psi = \frac{\sum_{n,m} c_n^* c_m \overbrace{\int dq \psi_n^* \hat{f} \psi_m}^{\langle \psi_n | \hat{f} | \psi_m \rangle}}{\sum_n |c_n|^2} = \frac{\sum_n |c_n|^2 f_{nn}}{\sum_n |c_n|^2} \quad (1.70)$$

(Achtung: inkohärente Superposition, $c_n^* c_m = 0$ f. $n \neq m$ nur möglich bei WW mit Umgebung!)

Def: statistischer Operator/Dichtematrix

$$\rho_{nm} \equiv \langle \psi_m | \rho | \psi_n \rangle \equiv \delta_{nm} |c_n|^2 \quad (1.71)$$

$$\Rightarrow \langle f \rangle = \frac{\sum_n \langle \psi_n | \hat{f} | \psi_n \rangle |c_n|^2}{\sum_n |c_n|^2} = \frac{\text{Tr}(f\rho)}{\text{Tr} \rho} \quad (1.72)$$

$$\rho = \sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| |c_n|^2 \quad (1.73)$$

Alternativ:

$$\rho = \sum_{E < E_n < E + \Delta E} C |\psi_n\rangle \langle \psi_n| \quad (1.74)$$

Anzahl der Zustände in $(E, E + \Delta E)$:

$$\text{Tr } \rho = \sum_n \rho_{nn} = \Delta\Gamma(E) \quad (1.75)$$

Makroskopische Systeme: $\Delta E \ll E \quad \Rightarrow \quad \Delta\Gamma(E) = n(E)\Delta E$
mit annähernd kontinuierlicher Zustandsdichte $n(E)$

Def. Entropie:

$$S(E, V) \equiv k_B \ln \Delta\Gamma(E) \quad (1.76)$$

Kanonisches Ensemble:

System im Gleichgewicht mit Wärmebad, Energieaustausch aber kein Teilchenaustausch

$$\text{Dichtematrix} \quad \rho_{nm} = \delta_{nm} e^{-\beta E_n}; \quad \beta = \frac{1}{k_B T} \quad (1.77)$$

$$\text{Zustandssumme} \quad Z_N(V, T) = \text{Tr } \rho = \sum_n e^{-\beta E_n} \quad (1.78)$$

$$\text{freie Energie} \quad Z_N(V, T) = e^{-\beta F(V, T)} \quad (1.79)$$

$$\text{Observable.} \quad \langle f \rangle_N = \frac{\text{Tr}(\rho f)}{\text{Tr } \rho} = \frac{\text{Tr}(\rho f)}{Z_N} \quad (1.80)$$

Großkanonisches Ensemble:

System in Kontakt mit Wärmebad, Austausch von Energie und Teilchen

Def. Fugazität $z \equiv e^{\beta\mu}$

$$Z(z, V, T) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N(V, T) \quad (1.81)$$

$$\langle f \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{N=0}^{\infty} z^N \langle f \rangle_N \quad (1.82)$$

Oder:

$$Z(z, V, T) = \text{Tr } e^{-\beta(H - \mu N)} = \text{Tr } \rho \quad (1.83)$$

$$\langle f \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr}(\rho f) \quad (1.84)$$

Daraus alle thermodynamischen Funktionen

$$Z(z, V, T) = e^{-\beta F(V, T, N)} \quad (1.85)$$

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z \quad (1.86)$$

$$PV = \frac{1}{\beta} \ln Z \quad (1.87)$$

$$E = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad (1.88)$$

$$\bar{N} = \langle N \rangle = \frac{\sum_{N=0}^{\infty} N z^N Z_N}{\sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N} = z \frac{\partial}{\partial z} \ln Z \quad (1.89)$$

Zustandsgleichung: Eliminiere z.B. z aus Gleichungen für $P, \bar{N} \Rightarrow P(V, T, \bar{N})$

1.11 Phasenübergänge aus der Zustandssumme

Experimentell: Nichtanalytizitäten in thermodynamischen Funktionen
z. B. Druck bei Flüssig-Gas, Magnetisierung bei Ferromagnetismus

Aber: Zustandssumme $Z(z, V, T)$ ist analytische Funktion ihrer Variablen!

Wie kommt es mathematisch zu Singularitäten?

$\Rightarrow$ thermodynamischer Limes $V \rightarrow \infty$ bzw. $N \rightarrow \infty$ mit $v = \frac{V}{N}$ konstant

$\Rightarrow$ eine Folge mit wachsenden Volumina entspricht einer Sequenz analytischer Funktionen mit nichtanalytischer Grenzfunktion

$\Rightarrow$ Lee-Yang-Theorem (1952)

Beispiel:

klassisches System aus N Molekülen in Volumen V , WW Zweikörperpotenzial:

Endliches Volumen: $\exists$ maximale Anzahl von Molekülen $M(V)$

Für $N > M(V)$ ist E unendlich $\Rightarrow e^{-\beta E} = 0$

$$\Rightarrow Z_N(V, T) = 0 \quad \text{für } N > M(V) \quad (1.90)$$

Großkanonisch:

$$Z(z, V, T) = 1 + zZ_1(V, T) + \dots + z^n Z_n(V, T) \quad (1.91)$$

$Z_i > 0 \Rightarrow$ keine reell positiven Nullstellen

$$\frac{P}{T} = \frac{1}{V} \ln Z(z, V, T) \quad (\Omega = -PV = -T \ln Z) \quad (1.92)$$

$\Rightarrow$ Für beliebig großes, endliches V ist $P(V, T, z)$ eine analytische Funktion von z entlang der positiven reellen Achse mit $P > 0, (\partial P / \partial z) \geq 0$

$$\bar{N} = \langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \ln Z \quad (= T \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z) \quad (1.93)$$

$$\frac{1}{v} = \frac{\bar{N}}{V} = \frac{1}{V} z \frac{\partial}{\partial z} \ln Z \quad (1.94)$$

$$(1.95)$$

$\Rightarrow v(z)$ ist ebenso analytisch $\Rightarrow P(v)$ ist analytisch

Außerdem ist wegen

$$\left(\frac{\Delta N}{V}\right)^2 \stackrel{\text{SP1,3.8}}{=} \frac{T}{V^2} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \bar{N}\right)_{T,V} = \frac{1}{V^2} \left(z \frac{\partial}{\partial z} \bar{N}\right)_V = \frac{1}{V} z \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{v} \quad (1.96)$$

$$= -\frac{z}{V v^2} \frac{\partial v}{\partial z} \quad (1.97)$$

$$\frac{\partial P}{\partial v} = \frac{\partial P}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{T}{V} \left(\frac{\partial}{\partial z} \ln Z\right) \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{T}{v z} \frac{1}{\frac{\partial v}{\partial z}} = -\frac{T}{V v^3} \frac{1}{\left(\frac{\Delta N}{V}\right)^2} < 0 \quad \checkmark \quad (1.98)$$

Mechanische Stabilität gewährleistet

(d.h. keine scheinbar unphysikalischen Segmente wie bei van der Waals)

$\Rightarrow$ Für beliebiges endliches V sind P und v analytische Funktionen in einem Gebiet der komplexen z -Ebene einschließlich der positiven reellen Achse

$\Rightarrow$ Die Möglichkeit für Singularitäten kann es nur in thermodynamischem Limes geben, d. h. $N, V \rightarrow \infty$, $\frac{N}{V}$ fest

Dann gilt $M(V) \rightarrow \infty$ und die Grenzfunktion der großkanonischen Zustandssumme ist kein Polynom mehr

Lee-Yang-Theorem: Phasenübergänge treten auf, wenn Nullstellen z_0 der Zustandssumme, $Z(z_0, V, T) = 0$, im Limes $V \rightarrow \infty$ auf der reellen z -Achse liegen

Satz 1:

Der Limes $f_\infty(z) = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \ln Z(z, V, T)$ existiert für alle $z > 0$ und ist eine stetige, monoton steigende Funktion von z . Der Limes hängt nicht von der Gestalt von V ab, solange die Randfläche von V nicht schneller als $V^{2/3}$ wächst.

Satz 2:

Sei G ein Gebiet in der komplexen z -Ebene, das ein Segment der positiven reellen Achse einschließt und das keine Nullstellen der großkanonischen Zustandssumme enthält. In diesem Gebiet konvergiert die Größe $V^{-1} \ln Z(z, V, T)$ für $V \rightarrow \infty$ gleichmäßig gegen ihre Grenzfunktion. Die Grenzfunktion ist für alle $z \in G$ analytisch

Gleichmäßige Konvergenz:

$f_n(x)$ konvergiert in G gleichmäßig gegen $f_\infty(x)$, falls es zu jedem $\epsilon > 0$ eine natürliche Zahl $N(\epsilon)$ gibt, so dass für alle $n > N(\epsilon)$ und $x \in G$ gilt: $|f_n(x) - f_\infty(x)| < \epsilon$.

Diskussion:

Definiere eine thermodynamische Phase durch die Werte von z , die sich in einem Gebiet im Sinne von Satz 2 befinden.

Zustandsgleichung:

$$\frac{P}{T} = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \ln Z(z, T, V) = f_\infty(z) \quad (1.99)$$

$$\frac{1}{v} = \lim_{V \rightarrow \infty} V^{-1} z \frac{\partial}{\partial z} \ln Z(z, T, V) = z \frac{\partial}{\partial z} f_\infty(z) = \frac{z}{T} \frac{\partial P}{\partial z} \quad (1.100)$$

(bei gleichmäßiger Konvergenz Vertauschung $\lim \leftrightarrow z \frac{\partial}{\partial z}$ erlaubt)

$P > 0, \frac{\partial P}{\partial v} < 0$ bleibt bei Grenzwertbildung erhalten

Fall 1:

G enthält ganze positive reelle Achse $\Rightarrow$ das System hat nur eine einzige Phase

Fall 2:

Satz 2 gilt in G_1, G_2 separat

$z = z_0$: Wegen Satz 1 $\exists f_\infty(z)$ in jedem Gebiet $\Rightarrow P(z)$ stetig in z_0

Aber: Ableitung kann unstetig sein!

$\Rightarrow$ System besitzt zwei Phasen $z < z_0, z > z_0$

Wegen Satz 1 ist $\frac{1}{v(z)}$ nicht-abnehmende Funktion

$$\Rightarrow V^{-1} z \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{v(z)} = V^{-1} z \frac{\partial}{\partial z} z \frac{\partial}{\partial z} V^{-1} \ln Z(z, v) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 \geq 0$$

Möglichkeit 1: $\frac{\partial P}{\partial z}$ unstetig, Phasenübergang 1. Ordnung

Möglichkeit 2: $\frac{\partial P}{\partial z}$ stetig, $\frac{\partial^2 P}{\partial z^2}$ unstetig, Phasenübergang 2. Ordnung

In beiden Fällen sind die nichtanalytischen Funktionen Grenzfunktionen, die aus vollständig glatten Funktionen im Limes $V \rightarrow \infty$ angenähert werden.

2 Einige Spinmodelle

2.1 Das Ising Modell

Ursprüngl. Ziel: Beschreibung von Ferromagnetismus:

2-d Ising Modell exakt lösbar

⇒ seltenes Beispiel eines Phasenübergangs, für den exakte Lsg. existiert

⇒ Labor zum Test von Näherungsmethoden

⇒ Universalität: beschreibt kritisches Verhalten auch nichtmagnetischer Systeme

System aus N Gitterpunkten in $d = 1, 2, 3$ Dimensionen mit periodischen Randbedingungen, z. B.

Spinvariable $s_i = \pm 1$ $i = 1, \dots, N$ auf jedem Gitterpunkt

Gegebener Satz $\{s_i\}$: Konfiguration (von Spins)

Energie einer Konfiguration:

$$E\{s_i\} = -J \underbrace{\sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j}_{\langle ij \rangle = \langle ji \rangle, \text{ Paar nächster Nachbarn}} - H \sum_{i=1}^N s_i \quad (2.1)$$

$\sum_{\langle ij \rangle} \dots$: $\frac{N\gamma}{2}$ Terme bei γ nächsten Nachbarn pro Gitterpunkt

Bsp:

$$\gamma \begin{cases} 4 & 2d & \text{kubisch} \\ 6 & 3d & \text{kubisch} \\ 8 & 3d & \text{kubisch zentriert} \end{cases} \quad (2.2)$$

$$(2.3)$$

Spin-Spin Kopplung J , magn. Feld H

$J > 0$ Ferromagnetismus, $J < 0$ Antiferromagnetismus

Zustandssumme:

$$Z(H, T) = \sum_{s_1} \sum_{s_2} \dots \sum_{s_N = \pm 1} e^{-\beta E\{s_v\}} \quad (2.4)$$

$\Rightarrow 2^N$ Terme

Thermodynamik:

$$dE = TdS - MdH \quad \text{innere Energie} \quad (2.5)$$

$$F(H, T) = -\frac{1}{\beta} \ln Z(H, T), \quad E(H, T) = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z(H, T) \quad (2.6)$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_H = \frac{(E - F)}{T}, \quad (2.7)$$

Magnetisierung:

$$M(H, T) = \left\langle \sum_i s_i \right\rangle = \left\langle -\frac{\partial E}{\partial H} \right\rangle \quad (2.8)$$

$$= \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial H} \ln Z = -\left(\frac{\partial F}{\partial H}\right)_T \quad (2.9)$$

$$C_H = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_H \quad (2.10)$$

usw.

Spontane Magnetisierung (Ferromagnet) für $M(0, T) \neq 0$

Zustände mit gegebener Energie entartet!

2.2 Äquivalenz des Ising-Modells mit anderen Modellen

Das Gittergas:

Gitterplatz kann von Gasmolekül besetzt oder frei sein: $t_i = 0, 1$ für $i = 1, \dots, N$

$$E = -J \sum_{\langle i, j \rangle} t_i t_j - \mu \sum_i t_i \quad (2.11)$$

μ ist chemisches Potenzial:

$\mu > 0$ bevorzugt besetzte Gitterplätze

$\mu < 0$ leere Gitterplätze

Zwei Zustände $\Rightarrow$ Abbildung auf Spin möglich

$$t_i = \frac{1 + s_i}{2} \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} t_i = 0 \\ t_i = 1 \end{matrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} s_i = -1 \\ s_i = 1 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow E = -\frac{J}{4} \sum_{\langle i, j \rangle} (1 + s_i + s_j + s_i s_j) - \frac{\mu}{2} \sum_i (1 + s_i) \quad (2.12)$$

$$\sum_{\langle i, j \rangle} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{\gamma}, \quad \sum_{\langle i, j \rangle} s_i = \frac{\gamma}{2} \sum_i s_i \quad (2.13)$$

$$E = -\frac{J}{4} \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j - \left(\frac{J\gamma}{4} + \frac{\mu}{2} \right) \sum_i s_i - \underbrace{J \frac{N\gamma}{8} - \frac{\mu}{2} N}_{=\text{const}} \quad (2.14)$$

Reales Beispielsystem: H-Adsorption in die (110)-Oberfläche eines Eisengitters, 2-d Isingmodell (mit zusätzlicher Wechselwirkung)

Zweistofflegierungen

Z.B. Messing: Cu und Zn Atome in kubisch zentriertem Gitter
(eine Atomsorte auf den Ecken des Würfels, die andere im Zentrum)

$0 < T < T_c$ Atome tauschen Plätze, wachsende Unordnung
Wahrscheinlichkeit für Atom am "richtigen Platz" $> \frac{1}{2}$

$T > T_c$ Wahrscheinlichkeit für Atom am richtigen Platz $= \frac{1}{2}$

Experimentell: Streuung (Röntgen, Neutronen) am Kristallgitter

Zwei Gitter mit Abstand $a \xrightarrow{T} \text{Ein Gitter mit Abstand } a/2$

Modell: $s_i = 1 \Leftrightarrow \text{Cu}$, $s_i = -1 \Leftrightarrow \text{Zn}$

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{4} \sum_{\langle i,j \rangle} J_{CC}(1+s_i)(1+s_j) + \frac{1}{4} \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ZZ}(1-s_i)(1-s_j) \\ &\quad + \frac{1}{4} \sum_{\langle i,j \rangle} J_{CZ} \left[(1+s_i)(1-s_j) + (1-s_i)(1+s_j) \right] \\ &= -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i + \text{const} \end{aligned} \quad (2.15)$$

$$J = \frac{1}{4}(J_{CC} + J_{ZZ} + J_{CZ}), \quad \sum_i s_i = 0 \quad (2.16)$$

Ising-Modell ohne äußeres Feld

2.3 Verallgemeinerungen des Ising-Modells

Beispiele: ortsabhängiges Feld, ortsabhängige Wechselwirkung, langreichweitige Paarwechselwirkung, Mehrkörperwechselwirkung

$$E = -\frac{1}{4} \sum_{i,j} J_{ij} s_i s_j - \sum_i H_i s_i - \sum_{ijk} K_{ijk} s_i s_j s_k + \dots \quad (2.17)$$

Spin 1 Ising-Modell: 3 Zustände $s_i = 0, \pm 1$

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - K \sum_{\langle i,j \rangle} s_i^2 s_j^2 - D \sum_i s_i^2 - L \sum_{\langle i,j \rangle} (s_i^2 s_j + s_i s_j^2) - H \sum_i s_i \quad (2.18)$$

alle Kombinationen $s_i^\alpha s_j^\beta$ mit $\alpha, \beta = 0, 1, 2$, $s_i^3 = s_i$

Mehr Kopplungen $\Rightarrow$ reichere Phasenstruktur

2.4 Potts-Modelle

Betrachte q -Zustandsvariablen, $s_i = 1, 2, 3, \dots, q$, auf dem Gitter, WW zwischen nächsten Nachbarn

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \delta_{s_i s_j} \quad (2.19)$$

D.h. Energiebeitrag = $-J$ für benachbarte Spins im gleichen Zustand, sonst Null

Für $q = 2$ identisch mit Ising-Modell, aber nicht für $q = 3$

Physikalisches Beispielsystem: Graphitoberfläche adsorbiert Krypton, 2d 3-Zustand Potts-Modell

2.5 XY- und Heisenberg-Modelle

Ising-Modell: Spinkomponenten entlang Quantisierungsachse

Klassische Variante (z.B. magn. Momente auf Gitterpunkten):

Spins verhalten sich wie klassische Vektoren, kontinuierliche Orientierungen möglich

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j - H \sum_i s_i^z \quad (2.20)$$

QM: $s^{x,y,z} \sim \sigma^{x,y,z}$ Pauli-Matrizen

1. Spezialfall: $J_z = J_\perp$: Heisenberg-Modell

$$E = -J_z \sum_{\langle i,j \rangle} s_i^z s_j^z - J_\perp \sum_{\langle i,j \rangle} (s_i^x s_j^x + s_i^y s_j^y) - H \sum_i s_i^z \quad (2.21)$$

2. Spezialfall: $J_z = 0$: XY-Modell

3 Das Ising-Modell

3.1 Symmetrien

Für jede Funktion von Spinkonfigurationen ist

$$\sum_{s_i=\pm 1} f(\{s_i\}) = \sum_{s_i=\pm 1} f(\{-s_i\}) \quad (3.1)$$

Diskrete Reflexions- bzw. Umkehrsymmetrie: $\mathbb{Z}_2$

Außerdem ist:

$$E(H, J, \{s_i\}) = E(-H, J, \{-s_i\}) \quad (3.2)$$

Damit folgt:

$$\begin{aligned} Z(-H, J, T) &= \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(-H, J, \{s_i\})} \\ &= \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(-H, J, \{-s_i\})} \\ &= \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(H, J, \{s_i\})} \\ &= Z(H, J, T) \end{aligned} \quad (3.3)$$

Zustandssumme und freie Energie sind gerade Funktionen in H

Untergittersymmetrie bei $H = 0$:

Teile kubisches Gitter schachbrettartig (gerade, ungerade Plätze) in zwei identische Untergitter A, B

$$\begin{aligned} E(0, J, \{s_i\}) &= -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j \\ &= -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i^A s_j^B \\ &= E(0, J, \{s_i^A\}, \{s_i^B\}) \end{aligned} \quad (3.4)$$

$$E(0, -J, \{s_i^A\}, \{s_i^B\}) = E(0, J, \{-s_i^A\}, \{s_i^B\}) = E(0, J, \{s_i^A\}, \{-s_i^B\}) \quad (3.5)$$

Für die Konfigurationssumme gilt

$$\sum_{\{s_i\}} = \sum_{\{s_i^A\}} \sum_{\{s_i^B\}} \quad (3.6)$$

Damit folgt für die Zustandssumme

$$\begin{aligned}
 Z(0, -J, T) &= \sum_{\{s_i^A\}} \sum_{\{s_i^B\}} e^{-\beta E(0, -J, \{s_i^A\}, \{s_i^B\})} \\
 &= \sum_{\{s_i^A\}} \sum_{\{s_i^B\}} e^{-\beta E(0, J, \{-s_i^A\}, \{s_i^B\})} \\
 &= \sum_{\{s_i^A\}} \sum_{\{s_i^B\}} e^{-\beta E(0, J, \{s_i^A\}, \{s_i^B\})} \\
 &= Z(0, J, T)
 \end{aligned} \tag{3.7}$$

Ohne äußeres Magnetfeld und auf kubischem Gitter haben Ferromagnet ($J > 0$) und Antiferromagnet ($J < 0$) dieselben thermodynamischen Funktionen!

Achtung: Geometrieabhängig, gilt nicht auf triangulärem Gitter (lässt sich nicht in identische Untergitter aufteilen)

3.2 Existenz von Phasenübergängen

Im Folgenden sei $J > 0$

3.2.1 $T = 0$

Grundzustand:

$$\begin{aligned}
 -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j &\text{ minimiert durch } s_i = s_j \\
 -H \sum_i s_i &\text{ minimiert durch } s_i = \begin{cases} +1 & H > 0 \\ -1 & H < 0 \end{cases} \\
 \Rightarrow \text{Magnetisierung pro Spin} &\quad m = \frac{1}{N} \sum_i s_i = \begin{cases} +1 & H > 0 \\ -1 & H < 0 \end{cases}
 \end{aligned} \tag{3.8}$$

- Bei $T = 0$ existiert ein Phasenübergang auch in endlichem Volumen!
- Singularität entsteht durch Limes $\beta \rightarrow \infty$ anstelle von $V \rightarrow \infty$
- Grund: Kreuzen von Energieniveaus bei $H = 0$:
 $s_i = \pm 1$ haben gleiche Energie

3.2.2 $T \neq 0, d = 1$

Ferromagnet: langreichweitige Ordnung

$H = 0, T \neq 0$: Spins fluktuieren, wird die Ordnung zerstört?

Das geht im thermodynamischen Limes nur mit einer thermodynamisch großen Zahl von Umklappprozessen:

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{N(V) - \overbrace{n}^{\text{endlich}}}{N(V)} = 1, \quad \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{N(V) - \overbrace{r}^{0 < r < 1} N(V)}{N(V)} < 1 \quad (3.9)$$

E minimal für vollständig geordneten Zustand:

$$E = -NJ \quad (3.10)$$

$$S = 0 \quad (3.11)$$

$$F = E \quad (3.12)$$

Betrachte Zustand mit 2 Domänen:

$$E = -(N-1)J + J = -NJ + 2J \quad (3.13)$$

$$S = k_B \ln N$$

$$\Delta F = F_2 - F_1 = 2J - k_B T \ln N \quad \text{zwischen Zuständen mit 1 oder 2 Domänen}$$

Für $T > 0$ geht bei $N \rightarrow \infty$ $\Delta F \rightarrow -\infty$

⇒ weitere Senkung von F durch zusätzliche Domäne

⇒ Fortsetzung bis Domäne = 1 Spin

⇒ Zustände mit langreichweitiger Ordnung instabil!

Es gibt keinen Phasenübergang bei $T > 0$ in $d = 1$!

3.2.3 $T \neq 0, d = 2$

Domänenwand enthalte n Links

$\Delta E \sim 2Jn$, Entropie?

Grobe Abschätzung: Wie viele Arten eine Domäne mit n Links zu bilden?

Startpunkt Rand, in jedem Schritt $(\gamma - 1)$ Richtungen möglich (nicht rückwärts!)

$$\begin{aligned} \Delta S &\lesssim \ln(\gamma - 1)^n && \text{Obere Schranke, Wand kreuzt sich nicht selbst} \\ &= n \ln(\gamma - 1) \end{aligned} \quad (3.14)$$

$$\Delta F_n = 2Jn - nT \ln(\gamma - 1) \quad (3.15)$$

Jetzt thermodynamischer Limes, $n \rightarrow \infty$, beachte Vorzeichen in ΔF !

$$\text{Für } T > T_c = \frac{2J}{\ln(\gamma - 1)} \Rightarrow \Delta F \rightarrow -\infty \quad (3.16)$$

Langreichweitige Ordnung instabil, Paramagnetismus mit $M = 0$

$$\text{Für } T < T_c \quad \Delta F \text{ minimal für } n \rightarrow 0 \quad (3.17)$$

Langreichweitige Ordnung stabil, Ferromagnetismus mit $M \neq 0$

$\Rightarrow$ Dies erfordert einen Phasenübergang!

Beachte: Es wurde nur die Existenz von Domänenwänden benutzt

$\Rightarrow$ Argument gültig für alle Hamiltonoperatoren mit diskreter Symmetrie

3.2.4 Unmöglichkeit von Phasenübergängen in endlichem Volumen

Symmetrie:

$$F(H, J, T) = F(-H, J, T) \quad (3.18)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow M(H, T) &= -\frac{\partial F(H)}{\partial H} = -\frac{\partial F(-H)}{\partial H} \\ &= \frac{\partial F(-H)}{\partial -H} = -M(-H, T) \end{aligned} \quad (3.19)$$

D.h. die Ableitung einer geraden Funktion ist eine ungerade Funktion

Für $H = 0$ bedeutet dies $M(0, T) = -M(0, T) \stackrel{!}{=} 0$

3.3 Spontane Symmetriebrechung

Das obige Argument ist nur gültig in endlichem V

Betrachte freie Energiedichte $f(H) = \frac{F(H)}{V}$, konvexe Funktion

$f(H) = f(-H) \Rightarrow M(0, T) = 0$ nur wenn die Funktion glatt ist,

d.h. Ableitungen von rechts und links gleich

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(\varepsilon) - f(0)}{\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(-\varepsilon) - f(0)}{\varepsilon} = 0 \quad (3.20)$$

Dies ist nicht der Fall für

$$f(H) = f(0) - m_0 |H| + O(H^\sigma), \quad \sigma > 1 \quad (3.21)$$

$$m = -\left. \frac{\partial f}{\partial H} \right|_{H=0} = \begin{cases} m_0 & H > 0 \\ -m_0 & H < 0 \end{cases} \quad (3.22)$$

Spontane Magnetisierung:

$$m_0 = \lim_{H \rightarrow 0^+} -\frac{\partial f(H)}{\partial H} \quad -m_0 = \lim_{H \rightarrow 0^-} -\frac{\partial f(H)}{\partial H} \quad (3.23)$$

Beachte Nichtvertauschung der Limites:

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \lim_{H \rightarrow 0} \frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial H} &= 0 \\ \lim_{H \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial H} &\neq 0 \end{aligned} \quad (3.24)$$

Für $H = 0$ ist $E(\{s_i\}) = E(\{-s_i\})$, aber $\langle \sum_i s_i \rangle \neq 0, m_0 = \pm 1$

⇒ Spontane Symmetriebrechung für $T < T_c!$

Hamiltonian ist symmetrisch unter Reflexion, Grundzustand ist nicht symmetrisch

Vgl: Bleistift balanciert auf Spitze

⇒ Umkipprichtung bricht Rotationssymmetrie spontan

Rezept zur Berechnung: erst kleines H betrachten, dann $H \rightarrow 0$

$H \neq 0$: explizite Symmetriebrechung

Hamiltonian nicht rotationssymmetrisch ⇒ Richtung ausgezeichnet

3.4 Ausblick: Kontinuierliche Systeme

Heisenberg-Modell:

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j - H \sum_i s_i^z \quad (3.25)$$

Sei $R(\theta) \in \mathbb{O}(3)$ Rotationsmatrix um den Winkel θ um beliebige Achse im x, y, z -Raum

Für $H = 0$: $E(\{s_i\}) = E(\{R(\theta) \cdot \mathbf{s}_i\})$

Man kann zeigen: für langreichweitige Ordnung wird $d > 2$ benötigt!

Qualitative Erklärung: thermische Fluktuationen haben “mehr Richtungen” zur Auswahl, um die Ordnung zu zerstören $\Rightarrow$ mehr Entropieerzeugung

Wird kompensiert durch Vergrößern von d : mehr nächste Nachbarn stabilisieren gegen thermische Fluktuationen

3.5 Lösung des Ising-Modells in $d = 1$

Def.: $h \equiv \beta H$ $K \equiv \beta J$ $\eta_i = s_i s_{i+1}$ für $i = 1, \dots, N-1$

$$Z(h, K, N) = \sum_{\{s_i\}} e^{-(K \sum_i s_i s_{i+1} - h \sum_i s_i)} \quad (3.26)$$

a) periodische Randbedingungen und $H = 0$:

Randbedingung: $s_{N+1} = s_1$

$$Z = \sum_{s_1} \dots \sum_{s_N} e^{K \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1} + K s_N s_1} \quad (3.27)$$

Benutze

$$s_N s_1 = s_N \underbrace{s_{N-1} s_{N-1}}_{=1} s_1 = s_N s_{N-1} s_{N-1} s_{N-2} s_{N-2} s_1 = \dots = \eta_{N-1} \eta_{N-2} \dots \eta_1 \quad (3.28)$$

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{s_1} \sum_{\eta_1} \dots \sum_{\eta_{N-1}} e^{K(\eta_1 + \dots + \eta_{N-1}) + K \eta_1 \eta_2 \dots \eta_{N-1}} \\ &= 2 \sum_{\eta_1} \dots \sum_{\eta_{N-1}} e^{K(\eta_1 + \dots + \eta_{N-1})} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{1}{l!} (K \eta_1 \dots \eta_{N-1})^l \\ &= 2 \sum_{l=0}^{\infty} \frac{K^l}{l!} \left(\sum_{\eta=\pm 1} \eta^l e^{K\eta} \right)^{N-1} \\ &= 2 \sum_{l=0}^{\infty} \frac{K^l}{l!} \left(1^l e^K + (-1)^l e^{-K} \right)^{N-1} \\ &= 2 \left((e^K + e^{-K})^{N-1} \sum_{\text{gerade } l} \frac{K^l}{l!} + (e^K - e^{-K})^{N-1} \sum_{\text{ungerade } l} \frac{K^l}{l!} \right) \\ &= (2 \cosh K)^N + (2 \sinh K)^N \end{aligned} \quad (3.29)$$

Damit Thermodynamik:

$$\begin{aligned} F &= -T [\ln[(2 \cosh K)^N + (2 \sinh K)^N]] \\ &= -NT \ln(2 \cosh K)^N \left(1 + (\tanh K)^N \right) \\ &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} -NT \ln(2 \cosh K) \end{aligned} \quad (3.30)$$

b) Freie Randbedingungen und $H = 0$: Blatt 2

3.6 Lösung über die Transfermatrix

Voriges Verfahren Ad Hoc, funktioniert nicht mehr für $H \neq 0$
 $\Rightarrow$ allgemeines Verfahren, übertragbar auf andere Modelle

Hier Ising ind $d = 1$ für $H \neq 0$, periodische R.B., Faktorisierung:

$$Z_N(h, K) = \sum_{s_1} \dots \sum_{s_N} e^{\frac{h}{2}(s_1+s_2)+Ks_1s_2} \dots e^{\frac{h}{2}(s_N+s_1)+Ks_Ns_1} \quad (3.31)$$

Def. Matricelement

$$T_{s_i s_j} \equiv e^{\frac{h}{2}(s_i+s_j)+Ks_i s_j} \quad (3.32)$$

$$\Rightarrow T = \begin{pmatrix} T_{1,1} & T_{1,-1} \\ T_{-1,1} & T_{-1,-1} \end{pmatrix} \quad \text{reell, symmetrisch} \quad (3.33)$$

Damit

$$Z_N(h, K) = \sum_{s_1} \dots \sum_{s_N} T_{s_1 s_2} T_{s_2 s_3} \dots T_{s_N s_1} = \text{Tr}(T^N) \quad (3.34)$$

Berechnung von T : Diagonalisieren

$$T' = S^{-1} T S = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad S^{-1} = S^T \quad \text{orthogonal} \quad (3.35)$$

Dann ist

$$\text{Tr}(T^N) = \text{Tr}(T'^N) = \lambda_1^N + \lambda_2^N \quad (3.36)$$

Sei $\lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_1 > \lambda_2$:

$$Z_N(h, K) = \lambda_1^N \left(1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^N \right) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \lambda_1^N \left(1 + O(e^{-\alpha N}) \right) \quad \alpha = \ln \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \quad (3.37)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{F}{N} = -T \ln \lambda_1 \quad (3.38)$$

$$\begin{aligned} \text{Eigenwerte von } T : \quad \det \begin{pmatrix} e^{h+K} - \lambda & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{-h+K} - \lambda \end{pmatrix} &= 0 & (3.39) \\ (e^{h+K} - \lambda)(e^{-h+K} - \lambda) - e^{-2K} &= 0 \end{aligned}$$

$$\lambda^2 - \lambda \underbrace{(e^{-h+K} + e^{h+K})}_{e^K 2 \cosh h} + e^{2K} - e^{-2K} = 0$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \lambda_{1/2} &= \frac{2e^K \cosh h \pm \sqrt{4e^{2K} \cosh^2 h - 4(e^{2K} - e^{-2K})}}{2} \\
&= e^K \cosh h \pm e^K \sqrt{\cosh^2 h - 1 + e^{-4K}} \\
&= e^K \left(\cosh h \pm \sqrt{\sinh^2 h + e^{-4K}} \right) \tag{3.40}
\end{aligned}$$

Ising-Modell in $d = 1$ gelöst!

3.7 Phasenübergang gemäß der exakten Lösung

a) Für $T > 0$ und $h, K \in \mathbb{R}$ ist

$$\begin{aligned}\sinh^2 h + e^{-4K} &> 0, \\ \cosh K &> 0\end{aligned}\tag{3.41}$$

$$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{F}{N} \text{ ist analytische Funktion}$$

Möglichkeiten für Phasenübergang:

λ_1 nichtanalytisch in K, h

$$\lambda_1 = \lambda_2$$

$$\lambda_1 = 0$$

für $T > 0$ nicht erfüllbar $\Rightarrow$ kein Phasenübergang!

b) Für $T = 0$ bzw. $K \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= e^K \left[\cosh h + \sqrt{\sinh^2 h} (1 + O(e^{-4K})) \right] \\ &= e^K \left[\cosh h + |\sinh h| \right]\end{aligned}\tag{3.42}$$

$$\begin{aligned}\cosh h + |\sinh h| &= \begin{cases} \frac{1}{2}(e^h + e^{-h} + e^h - e^{-h}) & h > 0 \\ \frac{1}{2}(e^{-h} + e^h - e^{-h} + e^h) & h < 0 \end{cases} \\ &= e^{|h|}\end{aligned}\tag{3.43}$$

Damit ist

$$\lambda_1 = e^{K+|h|}\tag{3.44}$$

$$\lim_{T \rightarrow 0} F = -NT(K + |h|) = -N(J + |H|)\tag{3.45}$$

$$\Rightarrow m = -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial H} = \begin{cases} 1 & H > 0 \\ -1 & H < 0 \end{cases} \text{ unstetig bei } H = 0\tag{3.46}$$

Beachte: für $T > 0$ hat man $|\sinh h| \rightarrow \sqrt{\sinh^2 h + e^{-4K}}$, analytisch bei $H = 0$

3.8 Thermodynamische Eigenschaften

$h = 0$:

$$F = -NT[K + \ln(1 + e^{-2K})] \quad (3.47)$$

$$\frac{F}{N} = \begin{cases} -J & T \rightarrow 0 \ (K \rightarrow \infty) \quad \text{Energie dominant} \\ -T \ln 2 & T \rightarrow \infty \ (K \rightarrow 0) \quad \text{Entropie dominant} \end{cases} \quad (3.48)$$

$h \neq 0$:

$$\frac{F}{N} = -J - T \ln[\cosh h + \sqrt{\sinh^2 h + e^{-4K}}] \quad (3.49)$$

$$\begin{aligned} m &= -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial H} = -\frac{1}{NT} \frac{\partial F}{\partial h} \\ &= \frac{\partial}{\partial h} \ln[\cosh h + \sqrt{\sinh^2 h + e^{-4K}}] \\ &= \frac{1}{\cosh h + \sqrt{\sinh^2 h + e^{-4K}}} \left(\sinh h + \frac{\sinh h \cosh h}{\sqrt{\sinh^2 h + e^{-4K}}} \right) \\ &= \frac{\sinh h}{\sqrt{\sinh^2 h + e^{-4K}}} \end{aligned} \quad (3.50)$$

Isotherme magnetische Suszeptibilität:
Änderung der Magnetisierung mit äußerem Feld

$$\chi_T \equiv \frac{\partial m}{\partial H} \quad (3.51)$$

Für $h \rightarrow 0$ wird $\sinh h \sim h$

$$\Rightarrow m \approx \frac{h}{e^{-2K}} = e^{2K} \frac{H}{T} \quad \chi_T \approx \frac{e^{2K}}{T} = \frac{e^{\frac{2J}{T}}}{T} \quad (3.52)$$

$$\chi_T \sim \begin{cases} 1/T & T \rightarrow \infty \quad \text{Curie-Gesetz} \\ e^{2J/T}/T & T \rightarrow 0 \end{cases} \quad (3.53)$$

Divergiert exponentiell bei $T = 0$!

3.9 Räumliche Korrelationen

Zweipunkt-Korrelationsfunktion

$$G(i, j) = \langle (s_i - \langle s_i \rangle)(s_j - \langle s_j \rangle) \rangle \quad (3.54)$$

Gibt die Korrelation in der Fluktuation von Spins i, j um Mittelwert an

$$G(i, j) = \langle s_i s_j \rangle - 2\langle s_i \rangle \langle s_j \rangle + \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle = \langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle^2 \quad (3.55)$$

Die letzte Gleichung gilt bei Translationsinvarianz, $\langle s_i \rangle = \langle s_j \rangle$

Damit ist die Wahrscheinlichkeit P_{ij} dafür, $s_i = s_j$ zu finden:

$$P_{ij} = \langle \delta_{s_i s_j} \rangle = \langle \frac{1}{2}(1 + s_i s_j) \rangle = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(G(i, j) + \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle \right) \quad (3.56)$$

3.9.1 Korrelationsfunktion mit Ad Hoc Methode

Für $T > 0$ ist $\langle s_i \rangle = 0$

1. Schritt: Korrelation nächster Nachbarn

$$\begin{aligned} G(i, j) &= \langle s_i s_j \rangle \\ &= \frac{1}{Z} \sum_{s_1} \dots \sum_{s_N} s_i s_j e^{K_1 s_1 s_2 + \dots + K_{N-1} s_{N-1} s_N} \end{aligned} \quad (3.57)$$

Beachte: Hier verschiedenes K_i für jedes Paar, setze $K_i = K$ am Ende

$$\begin{aligned} G(i, i+1) &= \langle s_i s_{i+1} \rangle \\ &= \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial K_i} \sum_{s_1} \dots \sum_{s_N} e^{K_1 s_1 s_2 + \dots} \\ &= \frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial K_i} Z = \frac{\partial}{\partial K_i} \ln Z(\{K_i\}) \end{aligned} \quad (3.58)$$

Hierbei ist aus voriger Rechnung

$$Z(\{K_i\}) = 2^N \prod_{i=1}^{N-1} \cosh K_i \quad (3.59)$$

$$\Rightarrow G(i, i+1) = \frac{1}{Z} 2^N \left(\prod_{i=1}^{N-1} \cosh K_i \right) \frac{\sinh K_i}{\cosh K_i} = \tanh K_i \quad (3.60)$$

2. Schritt: Iteration

$$\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial K_i} \frac{\partial}{\partial K_{i+1}} Z = \langle s_i s_{i+1} s_{i+1} s_{i+2} \rangle = \langle s_i s_{i+2} \rangle \quad (3.61)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow G(i, i+2) &= \tanh K_i \tanh K_{i+1} \\ G(i, i+j) &= \tanh K_i \tanh K_{i+1} \dots \tanh K_{i+j-1} \\ &= (\tanh K)^j \end{aligned} \quad (3.62)$$

Unabhängig von $i \Rightarrow$ translationsinvariant!

Analog $G(r, r') = G(r - r')$ in Kontinuumsnotation

Diskussion:

$T = 0, K = \infty$: $G(i, i+j) = 1$ für alle j

$\Rightarrow$ langreichweitige Ordnung, vollständig korreliert

$T \neq 0, K \neq \infty$: $\tanh K < 1, \coth K > 0$

$$G(i, i+j) = e^{-j \ln(\coth K)} \equiv e^{-j/\xi} \quad (3.63)$$

$\Rightarrow$ Exponentieller Abfall der Korrelation außerhalb der Korrelationslänge

$$\xi = \frac{1}{\ln(\coth K)} \quad (3.64)$$

D.h. über Längen $j < \xi$ Spins korreliert, $P_{ij} \sim O(1)$,
 $j > \xi$ Spins unkorreliert, $P_{ij} \approx \frac{1}{2}$

Für $T \rightarrow 0$: $K \rightarrow \infty, \xi \rightarrow \infty$ $T_c = 0$ Temperatur für Phasenübergang!
 $T \rightarrow \infty$: $K \rightarrow 0, \xi \rightarrow 0$

Details der Divergenz:

$$\begin{aligned} \coth K &= \frac{e^K + e^{-K}}{e^K - e^{-K}} = \frac{1 + e^{-2K}}{1 - e^{-2K}} = 1 + 2e^{-2K} + O(e^{-4K}) \\ \Rightarrow \xi &= \frac{e^{2K}}{2} = \frac{1}{2} e^{J/T} = \frac{1}{2} e^{J/(T-T_c)} \end{aligned} \quad (3.65)$$

Achtung: dieses Verhalten ist speziell für $d = 1$,
für $d > 1$ findet man $\xi(T) \sim (T - T_c)^{-\nu}$

3.9.2 Korrelationsfunktion über die Transfermatrix

$$\begin{aligned}
 \langle s_i \rangle &= \frac{1}{Z} \sum_{s_1} \dots \sum_{s_N} e^{-\beta \mathcal{H}_{s_i}} \\
 &= \frac{1}{Z} \sum_{s_1} \dots \sum_{s_N} T_{s_1 s_2} \dots T_{s_{i-1} s_i} s_i T_{s_i s_{i+1}} \dots
 \end{aligned} \tag{3.66}$$

Betrachte die Matrix

$$\begin{aligned}
 A_{ab} &= \sum_{s_i} T_{a s_i} T_{s_i b} s_i \\
 &= T_{a,1} T_{1,b} - T_{a,-1} T_{-1,b} \\
 A &= T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} T \\
 &= T \sigma^3 T
 \end{aligned} \tag{3.67}$$

$$\langle s_i \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr}(\sigma^3 T^N) = \frac{\text{Tr}(S^{-1} \sigma^3 S T'^N)}{\text{Tr} T'^N} \tag{3.68}$$

Sei S konstruiert aus den Eigenvektoren von T ,

$$\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \Rightarrow S = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \tag{3.69}$$

Sei weiterhin

$$S^{-1} \sigma^3 S = \begin{pmatrix} e & g \\ f & k \end{pmatrix}. \Rightarrow T'^N = \begin{pmatrix} \lambda_1^N & 0 \\ 0 & \lambda_2^N \end{pmatrix} \tag{3.70}$$

Dann ist

$$\langle s_i \rangle = \frac{e \lambda_1^N + k \lambda_2^N}{\lambda_1^N + \lambda_2^N} \tag{3.71}$$

N.B.: e, f, g, k sind Funktionen von h, K , die explizit ausgewertet werden können!

$$\lim_{N \rightarrow \infty} : \langle s_i \rangle = \frac{e \lambda_1^N \left(1 + \frac{k}{e} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^N \right)}{\lambda_1^N \left(1 + \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^N \right)} \rightarrow e(h, K) \tag{3.72}$$

Analog für die Zweipunktfunktion:

$$\begin{aligned}
\langle s_i s_{i+j} \rangle &= \frac{1}{Z} \text{Tr} (T^{i-1} \sigma_3 T^j \sigma_3 T^{N-j-i+1}) \\
&= \frac{1}{Z} \text{Tr} (\sigma_3 T^j \sigma_3 T^{N-j}) \\
&= \frac{1}{Z} \text{Tr} (S^{-1} \sigma_3 S T'^j S^{-1} \sigma_3 S T'^{N-j}) \\
&= \frac{1}{Z} \frac{\text{Tr} \begin{pmatrix} e\lambda_1^j & g\lambda_2^j \\ f\lambda_1^j & k\lambda_2^j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e\lambda_1^{N-j} & g\lambda_2^{N-j} \\ f\lambda_1^{N-j} & k\lambda_2^{N-j} \end{pmatrix}}{\lambda_1^N + \lambda_2^N} \\
&= \frac{e^2 \lambda_1^N + gf \lambda_1^{N-j} \lambda_2^j + gf \lambda_1^j \lambda_2^{N-j} + k^2 \lambda_2^N}{\lambda_1^N + \lambda_2^N} \\
&\xrightarrow{N \rightarrow \infty} e^2 + gf \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^j \tag{3.73}
\end{aligned}$$

Wir erhalten insgesamt

$$\begin{aligned}
G(i, i+j) &= \langle s_i s_{i+j} \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle \\
&= gf \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^j = gf e^{-j \ln(\lambda_2/\lambda_1)} \tag{3.74}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{1}{\ln(\lambda_1/\lambda_2)} \tag{3.75}$$

Korrelationslänge divergiert, $\xi \rightarrow \infty$ für $\lambda_1 \rightarrow \lambda_2$

3.10 Verallgemeinerung der Transfermatrix

T existiert auch in anderen Modellen, wenn Z faktorisiert

(2×2) -Matrix nur in $d = 1$ mit Nächste-Nachbar-Wechselwirkung

Im Allgemeinen hängt die Größe von T ab von der Anzahl der Zustände und der Reichweite der WW

Beispiele:

- q -Zustand Potts-Modell in $d = 1$, Nächste-Nachbar-WW: $(q \times q)$ -Matrix
- Ising-Modell $d = 1$ mit N.N. und Ü.n.N. WW: benötige $s_i s_{i+1} s_{i+2} s_{i+3}$
- Ising-Modell in $d = 2$: $(\infty \times \infty)$ -Matrix

Allgemeiner Fall:

Sei T eine $n \times n$ Matrix mit $T_{ij} > 0$ und Eigenwerten $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n|$

Perron-Frobenius-Theorem:

Sei $\lambda_1 > 0, \lambda_2 \neq \lambda_1$ für $n < \infty \Rightarrow \lambda_i$ mit $i > 1$ im Allgemeinen komplex

$$\begin{aligned}
 f &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{F}{N} = -T \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln Z \\
 &= -T \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln \left[\lambda_1^N \left(1 + \sum_{i>1} \frac{\lambda_i^N}{\lambda_1^N} \right) \right] \\
 &= -T \ln \lambda_1
 \end{aligned} \tag{3.76}$$

$\Rightarrow$ Nur λ_1 benötigt, nicht das ganze Spektrum

Korrelationsfunktion:

$$\begin{aligned}
 G(i, i+j) &= \langle s_i s_{i+j} \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle \\
 \xi^{-1} &= \lim_{j \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{j} \ln |G(i, i+j)| \right) = \ln \frac{\lambda_1}{\lambda_2}.
 \end{aligned} \tag{3.77}$$

4 Kritische Phänomene

$\hat{=}$ thermodynamisches Verhalten nahe kontinuierlichem Phasenübergang oder kritischem Punkt, d.h. Phasenübergänge 2. Ordnung
 $\Rightarrow$ universell, unabhängig von Details des Systems!
 $\Rightarrow$ gleiche Phänomene für sehr verschiedene Systeme wie Flüssig-Gas, Magnetismus, Supraleitung, QFT, ...

Terminologie: bezieht sich meist auf Ferromagnetismus $\Rightarrow$ Spinmodelle
(mit großer Genauigkeit numerisch lösbar!)

4.1 Phänomenologie

Experimenteller Befund:

Bei Annäherung an einen kritischen Punkt (Phasenübergang zweiter Ordnung) divergieren oder verschwinden verschiedene Observablen gemäß **Potenzgesetzen** mit sogenannten kritischen Exponenten

Phasendiagramm Flüssig-Gas-System:

Betrachte Annäherung an kritischen Punkt auf Pfaden *I, II, III*

$$t = \frac{T - T_c}{T}, \quad n = \frac{N}{V} \quad (4.1)$$

$$\text{Wärmekapazität: } C_V \sim \begin{cases} (-t)^{-\alpha} & (II) \quad T < T_c, n \rightarrow n_c \\ t^{-\alpha} & (I) \quad T > T_c, n = n_c \end{cases} \quad (4.2)$$

$$\text{Ordnungsparameter } \Delta n \sim \begin{cases} (-t)^\beta & (II) \quad T < T_c, n \rightarrow n_c \\ \text{nicht def.} & T > T_c \end{cases} \quad (4.3)$$

$$\text{Kompressibilität: } \kappa_T \sim \begin{cases} (-t)^{-\gamma} & (II) \quad T < T_c \\ t^{-\gamma} & (I) \quad T > T_c \end{cases} \quad (4.4)$$

$$\text{Zustandsgleichung: } P \sim \begin{cases} |n - n_c|^\delta & (III) \quad T = T_c \end{cases} \quad (4.5)$$

$$(4.6)$$

Die Exponenten $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \dots$ (es gibt weitere!) heißen kritische Exponenten

Phasendiagramm Ferromagnet:

Spontane Magnetisierung unterhalb einer kritischen Temperatur

$$\text{Wärmekapazität: } C_H \sim \begin{cases} (-t)^{-\alpha} & H = 0 \quad T < T_c \\ t^{-\alpha} & H = 0 \quad T > T_c \end{cases} \quad (4.7)$$

$$\text{Ordnungsparameter } M \sim \begin{cases} (-t)^\beta & H = 0 \quad T < T_c \\ \text{nicht def.} & T > T_c \end{cases} \quad (4.8)$$

$$\text{Suszeptibilität: } \chi \sim \begin{cases} (-t)^{-\gamma} & H = 0 \quad T < T_c \\ t^{-\gamma} & H = 0 \quad T > T_c \end{cases} \quad (4.9)$$

$$\text{Zustandsgleichung: } H \sim \begin{cases} M^\delta & T = T_c \end{cases} \quad (4.10)$$

$$(4.11)$$

Die Werte der kritischen Exponenten sind nicht alle unabhängig: Skalengesetze

Rushbrooke: $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$

Widom: $\gamma = \beta(\delta - 1)$

Josephson: $\nu d = 2 - \alpha$

etc.

Die Werte der kritischen Exponenten hängen *nicht* von den Details mikroskopischer Wechselwirkungen, sondern nur von den **Symmetrien** und der **Dimensionalität** des Systems ab

⇒ Klassen verschiedener Systeme mit gleichen kritischen Exponenten
≐ Universalitätsklassen

Beispiel: Kritische (End-) Punkte der Universalitätsklasse 3d Ising oder 3d $Z(2)$

- Ising-Modell (Namensgeber)
- einkomponentige Ferromagnete
- Flüssig-Gas-Systeme: Wasser und viele andere Substanzen
- Kernmaterie
- Elektroschwache Theorie bei endlicher Temperatur
als Funktion der Higgsmasse (relevant für frühes Universum!)
- Chiraler Phasenübergang in der QCD?

4.2 Potenzgesetze und Reskalierung

Wie ändern sich Größen unter einer Änderung der Längenskala?

Beispiele:

a) 3. Gesetz von Kepler

$$T^2 \sim R^3$$

Periode große Halbachse d. Bahnellipse (4.12)

Unter Reskalierung der Längeneinheit eines Systems mit $L \rightarrow L' = bL$, $b > 0$

$$R' = bR, \quad \Rightarrow \quad T' = b^{3/2}T \quad (4.13)$$

Welche Größen bestimmen T ? $T = T(M, m, G, R)$

Skalierung festgelegt durch Dimensionalität der Größen:

$$[T] = \text{s}, \quad [R] = \text{m}, \quad [m, M] = \text{kg}, \quad [G] = \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2} \quad (4.14)$$

$$\text{Dimensionsanalyse} \Rightarrow \text{s}^2 = \frac{\text{kg s}^2}{\text{m}^3} \cdot \frac{1}{\text{kg}} \cdot \text{m}^3 \quad (4.15)$$

$$\Rightarrow T^2 = \frac{1}{G(\alpha m + \beta M)} R^3 \cdot \underbrace{f}_{\text{dim.los}}(\text{dim.lose Argumente}), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad (4.16)$$

Volle Lösung (Newton):

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G(m + M)} R^3 \quad (4.17)$$

b) Phasengeschwindigkeit c von Wellen in Flachwasser der Tiefe h
(ohne Viskosität, Oberflächenspannung)

$$c \sim \sqrt{h} \quad (4.18)$$

$\Rightarrow c' = b^{1/2}c$ unter Reskalierung der Längeneinheit mit b

Volle Lösung:

$$c^2 = \underbrace{\frac{g\lambda}{2\pi}}_{\sim \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \cdot \underbrace{\tanh\left(\frac{2\pi h}{\lambda}\right)}_{\text{dim.lose Fkt. dim.loser Arg.}} \xrightarrow{h \ll \lambda} \frac{g\lambda}{2\pi} \frac{2\pi h}{\lambda} \left(1 + O(h/\lambda)^2\right) \quad (4.19)$$

4.3 Korrelationsfunktion und Fluktuations-Dissipations-Theorem

Betrachte einen allgemeinen Ordnungsparameter mit Dichte $m(\mathbf{x})$

$$M = \left\langle \int d^3x m(\mathbf{x}) \right\rangle \quad \left(\sum \text{ statt } \int \text{ für diskrete Systeme} \right) \quad (4.20)$$

Korrelationsfunktion:

$$G(\mathbf{x}) = \langle m(\mathbf{x})m(0) \rangle - \langle m(\mathbf{x}) \rangle \langle m(0) \rangle \stackrel{\text{transl.inv.}}{=} \langle m(\mathbf{x})m(0) \rangle - \langle m(0) \rangle^2 \quad (4.21)$$

$$\frac{M}{V} = \frac{1}{V} \int d^3x \frac{\text{Tr}(m(\mathbf{x})e^{-\beta\mathcal{H}})}{\text{Tr} e^{-\beta\mathcal{H}}} = \frac{\text{Tr}(m(0)e^{-\beta\mathcal{H}})}{\text{Tr} e^{-\beta\mathcal{H}}} \quad (4.22)$$

Annahme: lineare Kopplung ans konjugierte Feld,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 - H \int d^3x m(\mathbf{x}), \quad \mathcal{H}_0 \text{ Hamiltonian für } H = 0$$

Direkter Zusammenhang zwischen Suszeptibilitäten und Korrelationsfunktionen:

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{1}{V} \frac{\partial M}{\partial H} \\ &= \beta \left(\frac{\int d^3x \text{Tr}(m(\mathbf{x})m(0) e^{-\beta\mathcal{H}})}{\text{Tr} e^{-\beta\mathcal{H}}} - \frac{\text{Tr}(m(0)e^{-\beta\mathcal{H}}) \int d^3x \text{Tr}(m(\mathbf{x})e^{-\beta\mathcal{H}})}{(\text{Tr} e^{-\beta\mathcal{H}})^2} \right) \\ &= \frac{1}{T} \int d^3x \left(\langle m(\mathbf{x})m(0) \rangle - \langle m(0) \rangle^2 \right) \\ &= \frac{1}{T} \int d^3x G(\mathbf{x}) \end{aligned} \quad (4.23)$$

Annahme: Bei Annäherung an einen kritischen Punkt:

$$G(\mathbf{x}) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{|\mathbf{x}|^p} e^{-\frac{|\mathbf{x}|}{\xi}} \quad (4.24)$$

Definition weiterer kritischer Exponenten:

$$\xi \sim |t|^{-\nu}, \quad t = 0: \quad p = d - 2 + \eta \quad (4.25)$$

Beachte:

- Divergenz der Korrelationslänge notwendig für Potenzgesetze
- Für $p \leq 3$ impliziert $\xi \rightarrow \infty$ auch $\chi \rightarrow \infty$

4.4 Die Skalierungshypothese

Divergierende Korrelationslänge impliziert:

- Alle mikroskopischen Freiheitsgrade sind korreliert und wirken als einzelne Gesamtheit
- Die Korrelationslänge ist die einzige relevante Skala des Systems
- Das System sieht auf allen Längenskalen gleich aus, d.h. es ist invariant unter Reskalierung
- Mikroskopische Physik irrelevant nahe kritischem Punkt!
- Universalitätsklassen nur durch Symmetrie und Dimensionalität festgelegt

Beschreibung von skaleninvarianten Systemen durch homogene Funktionen

$$f(bx_1, \dots, bx_n) = b^{D_f} f(x_1, \dots, x_n), \quad D_f : \text{ Homogenitätsgrad} \quad (4.26)$$

Allgemeine Behandlung:

Wg. Universalität Abbildung auf Spinmodell (numerisch zugänglich)

$$\frac{H_{eff}}{T} = tE + hM. \quad (4.27)$$

Aufspaltung freie Energiedichte in singulären und regulären Teil (willkürlich!):

$$f(t, h) = f_s(t, h) + f_{reg}(t, h) \quad (4.28)$$

Skalierungshypothese: die singulären Teile thermodynamischer Potentiale sind verallgemeinerte homogene Funktionen; für die freie Energie gilt dann:

$$f_s(t, h) = b^{-d} f_s(b^{D_t} t, b^{D_h} h) \quad (4.29)$$

in d räumlichen Dimensionen, mit den Dimensionen D_t, D_h der skalierenden Felder

⇒ Skalengesetze und kritische Exponenten können hergeleitet werden

Widom-Skalierungsform der freien Energie:

Wähle $t' = b^{D_t} t = 1 \Rightarrow b = |t|^{-1/D_t}$

$$f_s(t, h) = |t|^{\frac{d}{D_t}} f_s \left(1, \frac{h}{|t|^{\frac{D_h}{D_t}}} \right) \equiv |t|^{\frac{d}{D_t}} \mathcal{F}_{\pm} \left(\frac{h}{|t|^{\frac{D_h}{D_t}}} \right) \quad (4.30)$$

a) Magnetisierung nahe kritischem Punkt:

$$m(t, h) = -\frac{1}{T} \frac{\partial f_s(t, h)}{\partial h} = -\frac{1}{T} |t|^{\frac{d}{D_t}} \mathcal{F}'_{\pm} \left(\frac{h}{|t|^{\frac{D_h}{D_t}}} \right) |t|^{-\frac{D_h}{D_t}} \quad (4.31)$$

Bei Annäherung an kritischen Punkt geht $1/T = 1/(T_c(1+t)) \rightarrow \text{const}$, d.h.

$$m(t, h) \sim |t|^{\frac{d-D_h}{D_t}} \mathcal{F}'_{\pm} \left(\frac{h}{|t|^{\frac{D_h}{D_t}}} \right) \quad (4.32)$$

Vergleich mit experimentellen Ergebnissen für $h \rightarrow 0$:

$$m(t, 0) \sim |t|^{\beta} \Rightarrow \beta = \frac{d-D_h}{D_t} \quad (4.33)$$

b) Suszeptibilität bei verschwindendem äußerem Feld:

$$\chi_T(H=0) = \left. \frac{\partial m}{\partial H} \right|_{H=0} = \frac{1}{T} \left. \frac{\partial m}{\partial h} \right|_{h=0} \sim |t|^{\frac{d-2D_h}{D_t}} \mathcal{F}''_{\pm}(0) \quad (4.34)$$

Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen:

$$\chi_T(H=0) \sim |t|^{-\gamma} \Rightarrow \gamma = \frac{2D_h - d}{D_t} \quad (4.35)$$

c) Magnetisierung entlang der kritischen Isotherme

d.h. $T = T_c$ bzw. $t = 0$ aber $h \neq 0$:

Annahme: $\mathcal{F}'_{\pm}(x) \sim x^{\lambda}$ (λ unbekannt) nahe kritischem Punkt
($\Rightarrow$ Potenzgesetze gemäß Skalierungshypothese)

$$m(t, h) \sim |t|^{\frac{d-D_h}{D_t}} \left(\frac{h}{|t|^{\frac{D_h}{D_t}}} \right)^{\lambda} = |t|^{\beta - \lambda \frac{D_h}{D_t}} h^{\lambda} \quad (4.36)$$

Für $t \rightarrow 0$ ist

$$m(0, h) = \begin{cases} 0 & \beta > \lambda \frac{D_h}{D_t} \\ \infty & \beta < \lambda \frac{D_h}{D_t} \end{cases} \quad (4.37)$$

Experimentell: $m(0, h)$ endlich $\Rightarrow \beta = \lambda D_h / D_t$

Vergleich mit experimentellen Ergebnissen:

$$-NT^2 m \sim h^{\frac{1}{\delta}} \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{1}{\delta} \quad (4.38)$$

d) Wärmekapazität:

$$C_H = -NT \frac{\partial^2 f_s}{\partial t^2} = \quad (4.39)$$

Für $h = 0$ ist

$$f_s(t, 0) = |t|^{\frac{d}{D_t}} \mathcal{F}_{\pm}(0) \quad \Rightarrow \quad C_{H=0} \sim |t|^{\frac{d}{D_t} - 2} \quad (4.40)$$

Vergleich mit dem Experiment:

$$C_{H=0} \sim |t|^{-\alpha} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 2 - \frac{d}{D_t} \quad (4.41)$$

e) Korrelationsfunktion:

Für $H = 0, t \rightarrow 0$

$$G(x, t, h = 0) = \frac{1}{x^{d-2+\eta}} \mathcal{G}(x/\xi), \quad \text{mit } \xi \sim |t|^{-\nu} \quad (4.42)$$

Verallgemeinerung $H \neq 0$: korrelierte Spins verstärken Magnetfeld

$$G(x, t, h) = \frac{1}{x^{d-2+\eta}} \mathcal{G}_{\pm}\left(\frac{x}{\xi}, h\xi^y\right) = \frac{1}{x^{d-2+\eta}} \mathcal{G}_{\pm}\left(x|t|^{\nu}, \frac{h}{|t|^{\nu y}}\right) \quad (4.43)$$

Fluktuations-Dissipationstheorem:

$$\begin{aligned} T\chi &= \int d^d x G(x) \\ &= \xi^{d-(d-2+\eta)} \int d^d\left(\frac{x}{\xi}\right) \left(\frac{\xi}{x}\right)^{d-2+\eta} \mathcal{G}_{\pm}\left(\frac{x}{\xi}, \frac{h}{|t|^{\nu y}}\right) \\ &= |t|^{-\nu(2-\eta)} \mathcal{H}_{\pm}\left(\frac{h}{|t|^{\nu y}}\right) \stackrel{!}{\sim} |t|^{\frac{d-2D_h}{D_t}} \mathcal{F}_{\pm}''\left(\frac{h}{|t|^{\frac{D_h}{D_t}}}\right) \end{aligned} \quad (4.44)$$

$$\Rightarrow -\nu(2-\eta) = \frac{d-2D_h}{D_t} = -\gamma, \quad \nu y = \frac{D_h}{D_t} \quad (4.45)$$

Test: Alle Skalengesetze erfüllt, z.B.

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2 - \frac{d}{D_t} + 2\frac{d-D_h}{D_t} + \frac{2D_h-d}{D_t} = 2, \quad \text{etc.} \quad (4.46)$$

5 Mean-Field-Theorie und Landau-Theorie

5.1 Mean-Field-Theorie für das Ising-Modell

Näherungsverfahren für wechselwirkende Modelle, die nicht exakt lösbar sind

Verfahren rein phänomenologisch/thermodynamisch, nicht eindeutig!

Weiss'sche Molekularfeldtheorie

Betrachte das Ising-Modell in d Dimensionen, $J = 0$, d.h. ohne WW:

$$\begin{aligned} Z(0, H) &= \prod_{i=1}^N \left(e^{\beta H} + e^{-\beta H} \right) = \left(2 \cosh \frac{H}{T} \right)^N \\ m &= -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial H} = \tanh \frac{H}{T} \end{aligned} \quad (5.1)$$

Paramagnet, keine spontane Magnetisierung

$J \neq 0$:

- betrachte einzelnen Spin in einem effektiven Feld
 H^{eff} = äußeres Feld H plus Feld von allen anderen Spins
- bei Translationsinvarianz sind alle Spins gleichwertig
- durchschnittliches H^{eff} (= mean field) ist für alle Spins gleich!

Schreibe:

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i \equiv -\sum_i s_i H_i \\ H_i &= J \sum_{j=1}^{\gamma} s_j + H \\ &= J\gamma m + J \sum_j \underbrace{(s_j - \langle s_j \rangle)}_{=\delta s_j} H \end{aligned} \quad (5.2)$$

Hyperkubisches Gitter: $\gamma = 2d$

Näherung: Vernachlässigung der Fluktuationen um Mittelwert, δs_j

$\Rightarrow$ entspricht Vernachlässigung von WW $\sim s_i s_j$, $\Rightarrow$ freie Theorie!

$$\mathcal{H} = -H^{\text{eff}} \sum_i s_i, \quad H^{\text{eff}} = J\gamma m + H \quad (5.3)$$

$$m = \tanh \frac{H^{\text{eff}}}{T} = \tanh \frac{J2dm + H}{T} \quad (5.4)$$

Dies ist eine selbstkonsistente Gleichung, Lösung numerisch oder graphisch, $H = 0$:

$$\text{Wann wird } \tanh(2dJM/T) > M? \quad \Rightarrow \quad T_c = 2dJ$$

Zustandsgleichung in der Umgebung von T_c : Setze $\tau = T_c/T$

Mit $\tanh$ Additionstheorem

$$\tanh x \pm \tanh y = \tanh(x \pm y)(1 \pm \tanh x \tanh y) \quad (5.5)$$

erhält man

$$m = \tanh \left(\frac{H}{T} + m\tau \right) = \frac{\tanh \frac{H}{T} + \tanh m\tau}{1 + \tanh \frac{H}{T} \tanh m\tau} \quad (5.6)$$

$$\begin{aligned} m + m \tanh \frac{H}{T} \tanh m\tau &= \tanh \frac{H}{T} + \tanh m\tau \\ \tanh \frac{H}{T} &= \frac{m - \tanh m\tau}{1 - m \tanh m\tau} \end{aligned} \quad (5.7)$$

Entwickeln um kleine H, m :

$$\begin{aligned} \frac{H}{T} &\approx \frac{m - \left(m\tau - \frac{1}{3}(m\tau)^3 + \dots \right)}{1 - m(m\tau + \dots)} = \left(m(1 - \tau) + m^3 \frac{\tau^3}{3} \right) (1 + m^2\tau + \dots) \\ &\approx m(1 - \tau) + m^3 \left(\tau - \tau^2 + \frac{\tau^3}{3} \right) + O(m^4) \end{aligned} \quad (5.8)$$

Jetzt betrachte $H = 0$: $T \rightarrow T_c^-, \tau \rightarrow 1^+$

$$m^2 = \frac{\tau - 1}{(1 - \tau)\tau + \tau^3/3} \rightarrow 3 \frac{\tau - 1}{\tau^3} = 3 \left(\frac{T_c}{T} - 1 \right) \left(\frac{T}{T_c} \right)^3 \quad (5.9)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow m &= \pm \sqrt{3} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \left(\frac{T_c}{T} - 1 \right)^{1/2} \\ &= \pm \sqrt{3} \frac{T}{T_c} \left(\frac{T_c - T}{T_c} \right)^{1/2} \sim (-t)^\beta \end{aligned} \quad (5.10)$$

$\Rightarrow$ Magnetisierung geht mit Potenzgesetz nach 0, $H = 0, T_c$ ist kritischer Punkt!

$$\beta = \frac{1}{2} \quad (5.11)$$

Kritische Isotherme, $T = T_c$:

$$\frac{H}{T} \approx \frac{1}{3} m^3, \quad m \sim H^{\frac{1}{3}}, \quad \Rightarrow \quad \delta = 3 \quad (5.12)$$

Magnetische Suszeptibilität: $\chi_T = \frac{\partial m}{\partial H}$ aus Zustandsgleichung (5.8)

$$\frac{1}{T} \approx \chi_T(1 - \tau) + 3m^2\chi_T(\tau - \tau^2 + \frac{1}{3}\tau^3) \quad (5.13)$$

Für $T > T_c, m = 0$:

$$\chi_T = \frac{1}{T} \frac{T}{(T - T_c)} = \frac{1}{T_c} \frac{T_c}{T - T_c} \quad (5.14)$$

Für $T < T_c$ (5.9) einsetzen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \chi_T 3(\tau - 1) \\ \chi_T &= \frac{1}{3T} \frac{1}{\tau - 1} = \frac{1}{3T_c} \frac{T_c}{T_c - T} \end{aligned} \quad (5.15)$$

Insgesamt:

$$\chi_T = \frac{1}{3T_c} |t|^{-1} \sim |t|^{-\gamma} \quad \Rightarrow \quad \gamma = 1 \quad (5.16)$$

5.2 Mean-Field-Theorie für Flüssig-Gas-Übergang

Ordnungsparameter: Dichte oder Differenz in spezifischen Volumina

$$\frac{V_g}{N} - \frac{V_{fl}}{N} = v_g - v_{fl} \sim |T - T_c|^\beta \quad (5.17)$$

analog m beim Ferromagneten

Konjugiertes Feld: P analog H

Dementsprechend:

$$\begin{aligned} \chi_T = \frac{\partial m}{\partial H} \quad \longrightarrow \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} &\sim |T - T_c|^{-\gamma} \\ C_V &\sim |T - T_c|^{-\alpha} \\ |P - P_c| &\sim |V - V_c|^\delta \end{aligned} \quad (5.18)$$

Van der Waals entspricht Mean Field Behandlung!

$$(V - b) \left(P + \frac{a}{V^2} \right) = NT \quad (5.19)$$

a : Reduktion des Drucks pro Molekül durch WW im Mittel

$\Rightarrow$ effektiv konjugiertes Feld $P_{\text{eff}} = P + \frac{a}{V^2}$

Zustandsgleichung in reduzierten Parametern $\tau = T/T_c, p = P/P_c, v = V/V_c$

$$\left(p + \frac{3}{v^2} \right) \left(v - \frac{1}{3} \right) = \frac{8}{3} \tau \quad (5.20)$$

Umschreiben auf $t = \tau - 1, \phi = v - 1$

$$\left(p + \frac{3}{(\phi + 1)^2} \right) \left(\phi + \frac{2}{3} \right) = \frac{8}{3} (t + 1) \quad (5.21)$$

$$p = \frac{8(t + 1)}{3\phi + 2} - \frac{3}{(1 + \phi)^2} \quad (5.22)$$

Entwickeln um kritischen Punkt: $T_c, P_c, V_c \Leftrightarrow p_c = \tau_c = v_c = 1, \quad \phi_c = t_c = 0$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial p}{\partial t} &= \frac{8}{3\phi + 2}|_c = 4 \\
\frac{\partial p}{\partial \phi} &= -3 \frac{8(t+1)}{(3\phi + 2)^2}|_c + \frac{6}{(1+\phi)^3}|_c = 0 \\
\frac{\partial^2 p}{\partial \phi^2} &= 3 \frac{48(t+1)}{(3\phi + 2)^3}|_c - \frac{18}{(1+\phi)^4}|_c = 0 \\
\frac{\partial^2 p}{\partial \phi \partial t} &= -3 \frac{8}{(3\phi + 2)^2}|_c = -6 \\
\frac{\partial^3 p}{\partial \phi^3} &= -3 \cdot 9 \cdot 48 \frac{t+1}{(3\phi + 2)^4}|_c + \frac{72}{(1+\phi)^5}|_c = -9
\end{aligned} \tag{5.23}$$

Damit

$$p = 1 + 4t - 6t\phi - \frac{3}{2}\phi^3 + O(t\phi^2, \phi^4) \tag{5.24}$$

Gerechtfertigt a posteriori, weil $\phi \sim t^{1/2}$, siehe unten

Bei Phasenkoexistenz, $t < 0$, muss nach Maxwell-Konstruktion für die homogene PV-Kurve gelten:

$$\int_{v_{fl}}^{v_g} p \, dv = \int_{\phi_{fl}}^{\phi_g} p \, d\phi = 0 = \int_{\phi_{fl}}^{\phi_g} d\phi \left(1 + 4t - 6t\phi - \frac{3}{2}\phi^3\right) \tag{5.25}$$

In dieser Näherung geht das nur mit $\phi_{fl} = -\phi_g$

$$\begin{aligned}
p &= 1 + 4t - 6t\phi_g - \frac{3}{2}\phi_g^3 + \dots && \text{Gasphase} \\
p &= 1 + 4t + 6t\phi_g + \frac{3}{2}\phi_g^3 + \dots && \text{flüssige Phase}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Subtraktion} \quad \Rightarrow \quad 0 &= 12t\phi_g + \frac{6}{2}\phi_g^3 \\
\phi_g^2 &= -4t
\end{aligned} \tag{5.26}$$

$$\phi_g = 2\sqrt{-t} \sim |t|^\beta \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{1}{2} \tag{5.27}$$

Kritische Isotherme: $t = 0$

$$p - 1 = \frac{P - P_c}{P_c} = -\frac{3}{2}\phi^3 = -\frac{3}{2}\left(\frac{V - V_c}{V_c}\right)^3 \sim (V - V_c)^\delta, \quad \Rightarrow \quad \delta = 3 \tag{5.28}$$

$$\frac{\partial p}{\partial \phi} \Big|_{\phi=0} = -6t = \frac{V_c}{P_c} \frac{\partial P}{\partial V} \tag{5.29}$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial P} \sim \frac{1}{t} \sim |t|^{-\gamma} \quad \Rightarrow \quad \gamma = 1 \tag{5.30}$$

Kritische Exponenten in MFT gleich wie beim Ising-Ferromagneten, Universalität!

Teilchenzahlfuktuationen und Kompressibilität

Großkanonisch: $Z = \text{Tr} e^{-\beta(\mathcal{H}-\mu N)}$

$$\langle N \rangle = T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \mu} \right)_{T,V} \quad (5.31)$$

$$\begin{aligned} \langle N^2 \rangle &= \frac{\text{Tr} N^2 e^{-\beta(\mathcal{H}-\mu N)}}{\text{Tr} e^{-\beta(\mathcal{H}-\mu N)}} = \frac{1}{\beta^2} \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \mu^2} \\ &= \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \mu^2} + \langle N \rangle^2 \end{aligned} \quad (5.32)$$

$$\frac{PV}{T} = \ln Z \quad (5.33)$$

Damit gilt für die mittlere quadratische Fluktuation der Teilchenzahl

$$(\Delta N)^2 = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = T^2 \frac{V}{T} \frac{\partial^2 P}{\partial \mu^2} \quad (5.34)$$

Außerdem ist aus (5.33)

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial \mu} &= \frac{1}{v} \left(= \frac{\partial P}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial \mu} \right) \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 P}{\partial \mu^2} &= -\frac{1}{v^2} \frac{\partial v}{\partial \mu} = -\frac{1}{v^3} \frac{\partial v}{\partial P} \end{aligned} \quad (5.35)$$

Insgesamt erhalten wir

$$(\Delta N)^2 = -TV \frac{N^3}{V^3} \frac{1}{N} \frac{\partial V}{\partial P} = T \frac{N^2}{V} \kappa_T \quad (5.36)$$

Korrelationen: Sei $n = \langle n(\mathbf{x}) \rangle$ die mittlere Teilchendichte

$$\begin{aligned} G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') &= \frac{1}{n^2} \langle (n(\mathbf{x}) - n)(n(\mathbf{x}') - n) \rangle \\ &= \frac{1}{n^2} \left(\langle n(\mathbf{x})n(\mathbf{x}') \rangle - n^2 \right) \end{aligned} \quad (5.37)$$

Gesamte Teilchenzahl:

$$N = \int d^3x n(\mathbf{x}) \quad (5.38)$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \int d^3x d^3x' G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') &= \frac{1}{n^2} \int d^3x d^3x' \left(\langle n(\mathbf{x})n(\mathbf{x}') \rangle - n^2 \right) \\ &= \frac{1}{n^2} \left(\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 \right) \end{aligned} \quad (5.39)$$

Wegen Translationsinvarianz ist

$$\int d^3x d^3x' G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') = V \int d^3x G(\mathbf{x}) \quad (5.40)$$

$$\int d^3x G(\mathbf{x}) = T\kappa_T \quad (5.41)$$

$$\text{analog zu } \sum_i G(\mathbf{x}_i) = T\chi_T \quad (5.42)$$

Fluktuationen stehen immer in Beziehung mit einer zugehörigen ‘‘Suszeptibilität’’ (Antwortfunktion)

Experimentell: kritische Opaleszenz

Zweipunktfunktion gibt Dichtefluktuationen an

Lichtstreuung an Dichtefluktuationen nimmt dramatisch zu, wenn $\xi(T) \sim \lambda_{\text{Licht}}$ (Mehrfachstreuung), Medium wird undurchsichtig

Versagen der MFT bei kritischen Exponenten:

Divergenz in Suszeptibilitäten geht einher mit Divergenz in ξ : Fluktuationen sind an kritischen Punkten maximal und über alle Abstände korreliert, werden aber in MFT vernachlässigt!

5.3 Gemeinsamkeiten von Mean Field Theorien

a) van der Waals nahe kritischem Punkt:

Sei $\eta = \frac{1}{v} - 1, \phi = v - 1 = \frac{1}{\eta+1} - 1 = -\eta + O(\eta^2)$

$\eta = \frac{\rho}{\rho_c} - 1$ entspricht dem Ordnungsparameter

$$p = 1 + 4t + 6t\eta + \frac{3}{2}\eta^3 + O(\eta^2t, \eta^4) \quad (5.43)$$

Interpretation: Zustandsgleichung kann aufgefasst werden als Ergebnis der Minimierung eines verallgemeinerten thermodynamischen Potentials unter Variation des Ordnungsparameters

Def. Landau freie Energie:

$$L(p, \eta, T) = L_0(p, T) + \underbrace{\frac{N}{n_c^2}}_{\text{für } [L]} \left[-(p-1-4t)\eta + 3t\eta^2 + \frac{3}{8}\eta^4 \right] \quad (5.44)$$

Finde η so, dass L minimiert wird:

$$\frac{\partial L}{\partial \eta} = 0 \quad (5.45)$$

$$\Rightarrow -(p-1-4t) + 6t\eta + \frac{12}{8}\eta^3 = 0 \quad (5.46)$$

b) Ferromagnet nahe kritischem Punkt:

$$\frac{H}{T} = m(1-\tau) + m^3 \left(\tau - \tau^2 + \frac{\tau^3}{3} \right) \quad (5.47)$$

Mit $\tau = \frac{T_c}{T}, t = \frac{T-T_c}{T_c} = \frac{1}{\tau} - 1, \eta = m$ wird dies

$$\frac{H}{T} = \eta t + \eta^3 + O(t\eta^3) \quad (5.48)$$

$$\text{Def.: } L(\eta, T, H) = L_0(T, H) - \frac{\eta H}{T} + \frac{t\eta^2}{2} + \frac{1}{4}\eta^4 \quad (5.49)$$

Vergleich: L 's sind Funktionen des Ordnungsparameters, des konjugierten Feldes und der reduzierten Temperatur

Potenzen von η und deren Vorzeichen gleich für beide Fälle
 L ist wie der Beginn einer Taylorreihe

Ohne äußeres Feld ($H = 0$): nur gerade Potenzen

5.4 Landau-Theorie

Definiere eine Landau freie Energie bzw. ein Landau-Funktional L als Funktion der Kopplungen $\{K\}$ und des Ordnungsparameters η eines Systems

Gleichgewichtszustände sind globale Minima von $L(\eta)$

Bauprinzip:

- L muss die Symmetrien des Systems aufweisen
- In der Umgebung eines kritischen Punktes ist L in Taylorreihe in η entwickelbar, d.h. L ist analytisch in den Kopplungen $\{K\}$ und η

$$\mathcal{L} = \frac{L}{V} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(\{K\}) \eta^n \quad (5.50)$$

Beachte: dies kann nicht streng richtig sein, thermodynamische Potenziale sind am kritischen Punkt nichtanalytisch!

- In räumlich inhomogenen Systemen mit variierendem Ordnungsparameter $\eta(\mathbf{x})$ ist $\mathcal{L}$ eine lokale Funktion, d.h. von η und *endlich* vielen Ableitungen abhängig
- In der Umgebung eines kritischen Punktes ist $\eta = 0$ oder $\eta < 1$, Entwicklung kann approximiert werden

$$\mathcal{L} = \sum_{n=0}^4 a_n(\{K\}) \eta^n \quad (5.51)$$

5.4.1 Phasenübergänge 2. Ordnung

Symmetrische (ungeordnete) Phase: $\eta = 0$

Gebrochene (geordnete) Phase: $\eta \neq 0$

Beispiel Ising-Modell, $H = 0$:

$$\mathcal{L} = a_0 + a_1\eta + a_2\eta^2 + a_3\eta^3 + a_4\eta^4 + \dots \quad (5.52)$$

Symmetrie:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\{s_i\}) &= \mathcal{H}(\{-s_i\}) \\ \Rightarrow \mathcal{L}(\eta) &= \mathcal{L}(-\eta) \\ \Rightarrow a_1 = a_3 &= 0 \end{aligned} \quad (5.53)$$

Stabilität: $a_4 > 0$, ansonsten unendlich negatives Potenzial L

Bedingung für Extremum:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} = 2a_2\eta + 4a_4\eta^3 = 0 \quad (5.54)$$

Damit wird

$$\eta = 0, \pm \left(\frac{-a_2}{2a_4} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.55)$$

Bedingung für Minimum:

$$\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \eta^2} = 2a_2 + 12a_4\eta^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} T \rightarrow T_c^+ & a_2 > 0 \\ T \rightarrow T_c^- & a_2 < 0 \end{cases} \quad (5.56)$$

Koeffizienten entwickeln um kritischen Punkt:

$$\begin{aligned} a_2(T) &= a_{20} + a_{21} \frac{T - T_c}{T_c} + \dots \\ a_4(T) &= a_{40} + a_{41} \frac{T - T_c}{T_c} + \dots \end{aligned} \quad (5.57)$$

Wegen (5.56) muss $a_{20} = 0, a_{21} > 0$

$a_4 > 0$, sonst Minimierung von $\mathcal{L}$ durch $|\eta| \rightarrow \infty$
 a_{41} -Term trägt nicht zur führenden Ordnung in t bei
 $\Rightarrow a_{40} > 0, a_{41} = 0$

$a_0(\{K\}, T)$ ergibt Wert von $\mathcal{L}$ für $T > T_c$;
 unabhängig von $\eta \Rightarrow$ spielt für Phasenübergang keine Rolle!
 (entspricht regulärem Anteil thermodynamischer Potenziale)

Insgesamt:

$$\mathcal{L} = a_{21} \frac{T - T_c}{T_c} \eta^2 + a_{40} \eta^4 \quad (5.58)$$

mit noch zwei offenen Parametern $a \equiv a_{21}, b \equiv 2a_{40}$

Allgemeiner Fall $H \neq 0$: WW-Energie = $-H\eta$

$$\mathcal{L} = a\eta^2 + \frac{b}{2}\eta^4 - H\eta \quad (5.59)$$

Im Allgemeinen: benutze alle Potenzen und Kombinationen von Ordnungsparameterkomponenten, die mit den Symmetrien des Systems verträglich sind

Hier Ising-Modell: $H\eta^3$ möglich, aber nicht führend für singuläres Verhalten

Skizzen

$\Rightarrow L$ ergibt (per Konstruktion) einen kontinuierlichen Phasenübergang

Kritische Exponenten:

$$\text{Für } t < 0 \quad \eta = \pm \sqrt{\frac{a}{b}} (-t)^{\frac{1}{2}} \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{1}{2} \quad (5.60)$$

$H \neq 0$: Zustandsgleichung aus Extremumbedingung:

$$2at\eta + 2b\eta^3 = H \quad (5.61)$$

Kritische Isotherme:

$$t = 0 : \quad H \sim \eta^3 \quad \Rightarrow \quad \delta = 3 \quad (5.62)$$

Suszeptibilität ebenfalls aus Extremumbedingung, Ableiten nach H :

$$2at\chi_T + 6b\eta^2\chi_T = 1 \quad (5.63)$$

$$\Rightarrow \quad \chi_T = \frac{\partial \eta}{\partial H} = \frac{1}{2(at + 3b\eta^2)} \quad (5.64)$$

$$t > 0 : \quad \eta = 0 \quad \chi_T = \frac{1}{2at} \sim t^{-1} \quad \Rightarrow \quad \gamma = 1 \quad (5.65)$$

$$t < 0 : \quad \eta^2 = -\frac{a}{b}t \quad \chi_T = \frac{1}{-4at} \sim (-t)^{-1} \quad \Rightarrow \quad \gamma = 1$$

- Exponenten stimmen mit den in MFT berechneten überein
- Singuläres Verhalten aus analytischer Funktion L : $\eta(t, h)$ nichtanalytisch!
- Für räumliche Korrelationen: Ausdehnung auf inhomogene Systeme nötig!

5.4.2 Phasenübergänge 1. Ordnung

Verallgemeinerung: Systeme ohne Symmetrie $\mathcal{L}(\eta) = \mathcal{L}(-\eta)$

z.B.

$$\mathcal{L} = at\eta^2 + \frac{1}{2}b\eta^4 + C\eta^3 - H\eta \quad (5.66)$$

Sei $a > 0, b > 0, H = 0$:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} = 2at\eta + 2b\eta^3 + 3C\eta^2 = 0 \quad (5.67)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \eta &= 0 \\ \eta &= \frac{-3C \pm \sqrt{(3C)^2 - 4 \cdot 2b \cdot 2at}}{2 \cdot 2b} \\ &= -c \pm \sqrt{c^2 - at/b}, \quad c = \frac{3C}{4b} \end{aligned} \quad (5.68)$$

$$\begin{aligned} \text{Für reelles } \eta \neq 0 : \quad c^2 - \frac{at}{b} &> 0 \\ \text{oder :} \quad t &< \frac{c^2 b}{a} = t^* \end{aligned} \quad (5.69)$$

Beachte: Im Fall $c = 0$ ist $\eta \neq 0$ nur Lösung für $t < 0$, d.h. $T < T_c$
 Im Fall $c \neq 0$ auch $\eta \neq 0$ Lösungen für $T > T_c$

Skizzen

Def t_c : Entartung der beiden Minima

$$t > t_c : \quad \eta = 0 \quad \text{ist stabiler Zustand} \quad (5.70)$$

$$t < t_c : \quad \eta^2 \neq 0 \quad \text{ist stabiler Zustand}$$

Bei $t = t_c$ springt der Ordnungsparameter $\Rightarrow$ Phasenübergang 1. Ordnung

Achtung: Wegen $\eta(t_1) \neq 0$ und nicht notwendigerweise klein für $t \rightarrow t_1^-$ ist Landau-Theorie dort *nicht* gut

Hinreichende (aber nicht notwendige!) Voraussetzung für Existenz eines kontinuierlichen Phasenübergangs in MFT: Abwesenheit eines kubischen Terms

Bemerkung: Landau-Theorie entspricht MFT, nicht richtig, wenn Fluktuationen wichtig sind!!

Beispiele:

- 3-Zustands Potts-Modell in $d = 2$:
MFT ergibt 1.O., Lösung ist 2.O.
- Type-I Supraleiter - Metallübergang in $d = 3$:
MFT ergibt 2.O., in Wirklichkeit 1.O.

5.4.3 Landau-Theorie für trikritische Punkte

Sei

$$\mathcal{L} = \frac{a}{2}\eta^2 + \frac{b}{4}\eta^4 + \frac{c}{6}\eta^6, \quad c = \text{const} > 0 \quad (5.71)$$

Die Koeffizienten hängen im Allgemeinen von thermodynamischen Zustandsgrößen ab, $a = a(T, \dots), b = b(T, \dots)$

Kein η^3 -Term $\Rightarrow$ es gibt einen kontinuierlichen Phasenübergang

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} &= a\eta + b\eta^3 + c\eta^5 \\ \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial \eta^2} &= a + 3b\eta^2 + 5c\eta^4 \end{aligned} \quad (5.72)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} = 0, \quad \Rightarrow \quad \eta_1 = 0, \quad \eta_{\pm}^2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c} \quad (5.73)$$

D.h. 5 Lösungen $\eta_1 = 0, \pm\eta_+, \pm\eta_-$

Natur der Extrema:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}''(\eta = 0) &= a \\ \mathcal{L}''(\eta_{\pm}^2) &= \left[\frac{1}{\eta} \underbrace{(a\eta + b\eta^3 + c\eta^5)}_{=0} \right] + (2b + 4c\eta_{\pm}^2)\eta_{\pm}^2 = \left(2b + 2(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) \right) \eta_{\pm}^2 \\ &= \pm 2\sqrt{b^2 - 4ac} \eta_{\pm}^2 \end{aligned} \quad (5.74)$$

$$a < 0 \Rightarrow \eta_1 \text{ Maximum, } \eta_+ \text{ Minimum, } \eta_- \text{ Maximum}$$

$$a > 0 \Rightarrow \eta_1 \text{ Minimum;}$$

$$b > 0 \Rightarrow \sqrt{\eta_{\pm}^2} \text{ komplex} \Rightarrow \eta_1 \text{ einziges Minimum}$$

Phasenübergänge 2.O. für $a = 0, b > 0$

Skizze

Für $b < 0, a > 0$ drei Minima!

$$\mathcal{L}(0) = 0, \quad \mathcal{L}(\pm\eta_+) = 0 \quad (5.75)$$

Dies ist der Fall für

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} = 0 &\Leftrightarrow 3a + \frac{3}{2}b\eta_+^2 + c\eta_+^4 = 0 \\
\underbrace{(a + b\eta_+^2 + c\eta_+^4)}_{=0 \text{ wg. } \mathcal{L}'=0} + 2a + \frac{1}{2}b\eta_+^2 &= 0 \\
\Rightarrow \eta_+^2 &= -\frac{4a}{b}
\end{aligned} \tag{5.76}$$

Daraus mit (5.73) Zusammenhang zwischen den Landau-Parametern:

$$\begin{aligned}
-\frac{4a}{b} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c} \\
-8ac + b^2 &= b\sqrt{b^2 - 4ac} \\
(8ac)^2 + b^4 - 16acb^2 &= b^2(b^2 - 4ac) \\
b^2 &= \frac{64(ac)^2}{12ac} = \frac{16}{3}ac \\
\Rightarrow b &= -4\sqrt{\frac{ac}{3}} \quad (b < 0)
\end{aligned} \tag{5.77}$$

Phasenübergang 1.O. für $b = -4\sqrt{ac/3}$, Sprung im Ordnungsparameter:

$$\Delta\eta = \eta_+ - 0 = \sqrt{-\frac{4a}{b}} \tag{5.78}$$

Trikritischer Punkt: $a = 0, b = 0$

= Kritischer Endpunkt einer Tripellinie 1.O., Übergang zu einer Linie 2.O.

Trikritische Exponenten?

$\mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{L} - \frac{H}{T}\eta$, Betrachte Annäherung entlang $b = 0$

Sei wieder $a = a_0t + O(t^2)$, $a_0 > 0$

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}(\eta) &= \frac{1}{2}a_0t\eta^2 + \frac{1}{6}c\eta^6 - \frac{H}{T}\eta \\
\mathcal{L}'(\eta) &= a_0t\eta + c\eta^5 - \frac{H}{T}
\end{aligned} \tag{5.79}$$

$$H = 0 : \quad \eta = \begin{cases} 0 & t > 0 \\ (\frac{a_0}{c})^{1/4}(-t)^{1/4} & t < 0 \end{cases} \Rightarrow \beta = \frac{1}{4} \tag{5.80}$$

$H \neq 0$: Zustandsgleichung aus $\mathcal{L}' = 0$, ableiten $\partial/\partial H$, $\chi \equiv \partial\eta/\partial H$

$$\Rightarrow a_0 t \chi + 5c\eta^4 \chi = \frac{1}{T} \quad (5.81)$$

$$t < 0: \quad \chi = \frac{1}{T} \frac{1}{a_0 t - 5c(a_0/c)t} \sim t^{-1} \quad \Rightarrow \quad \gamma = 1 \quad (5.82)$$

$$t > 0: \quad \chi = \frac{1}{T} \frac{1}{a_0 t} \sim t^{-1}$$

Trikritische Isotherme: $t = 0$

$$\Rightarrow c\eta^5 = \frac{H}{T} \quad \Rightarrow \quad H \sim \eta^5 \quad \Rightarrow \quad \delta = 5 \quad (5.83)$$

In welcher Region gelten trikritische Exponenten, und wo die kritischen?

Trikritische Exponenten sind abgeleitet für Annäherung entlang $b = 0$; gültig wenn b vernachlässigbar in

$$\begin{aligned} a + b\eta^2 + c\eta^4 &= 0 \quad (\text{bestimmt Lsg. für } \eta) \\ \Rightarrow |b\eta^2| &\ll |a| \end{aligned} \quad (5.84)$$

Dann ist

$$\eta^2 = \sqrt{-\frac{a}{c}} \quad \Rightarrow \quad b^2 \ll |a|c \quad (5.85)$$

Standard 2.O. Verhalten hinreichend weit weg vom trikritischen Punkt, d.h.

$$\begin{aligned} |b\eta^2| &\gg |c\eta^4| \quad \Rightarrow \quad \eta^2 = -\frac{a}{b} \\ b^2 &\gg c|a| \end{aligned} \quad (5.86)$$

“Crossover-Linie” zwischen kritischem und trikritischem Verhalten:

$$b \sim \sqrt{c|k|} \quad (5.87)$$

5.5 Inhomogene Systeme und Blockspins

MFT vernachlässigt langreichweitige Fluktuationen/Korrelationen

⇒ Verbesserung: Betrachte ortsabhängiges $\eta(\mathbf{x})$
(notwendig auch für inhomogene äußere Felder $H(\mathbf{x})$)

Spinmodell: Bereiche mit $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| \leq \xi(T)$ sind korreliert, entsprechen Domänen mit konstanter mittlerer Magnetisierung

⇒ Teile Gitter in Blocks der Größe $\Lambda^{-1} \approx \xi(T)$

Lokale Magnetisierung für Block zentriert bei $\mathbf{x}$ =Blockspin:

$$M_\Lambda(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_\Lambda(\mathbf{x})} \sum_i \langle s_i \rangle \quad (5.88)$$

$N_\Lambda(\mathbf{x}) = \Lambda^{-d}/a^d$ Anzahl der Spins im Block

Sinnvolle Einteilung besonders nahe T_c , weil dort $\xi \gg a$ und damit

$$a \ll \Lambda^{-1} \leq \xi(T) \quad (5.89)$$

Dann ist $N_\Lambda \sim O(\xi^d/a^d)$ groß, Fluktuationen der Blockspins mild

Definition von Blockspins $\hat{=}$ "Coarse graining"

Bedeutung von Λ : Im Impulsraum

$$M_\Lambda(\mathbf{x}) = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} M_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \quad (5.90)$$

hat die lokale Magnetisierung keine Fourierkomponente $> \Lambda$

Jetzt Konstruktion der Landau freien Energie des Systems:

$$L = \sum_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(M_\Lambda(\mathbf{x})) \quad (5.91)$$

ist kein Fortschritt, Minimierung ergibt Gleichgewichtswert $M_\Lambda = M$ in jedem Block

⇒ Einbau von Fluktuationen, diese kosten Energie
(cf. Domänengrenzen im Ising-Modell), Modellierung durch

$$\sum_{\mathbf{x}} \sum_{\boldsymbol{\delta}} \frac{\gamma'}{2} \left(\frac{M_\Lambda(\mathbf{x}) - M_\Lambda(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta})}{\Lambda^{-1}} \right)^2, \quad |\boldsymbol{\delta}| = \Lambda^{-1}, \quad \gamma' = \gamma'(T) > 0 \quad (5.92)$$

δ verbindet benachbarte Blöcke; die Energiekosten sind unabhängig vom Vorzeichen der Fluktuation!

Nahe einem kritischen Punkt ist $a \ll \Lambda^{-1}$, quasi-kontinuierlich, und im thermodynamischen Limes $\Lambda^{-1} \ll L$

Im Kontinuum und thermodynamischen Limes wird die Landau freie Energie

$$L = \int d^3x \left[\mathcal{L}(M_\Lambda(\mathbf{x})) + \frac{\gamma}{2} \left(\nabla M_\Lambda(\mathbf{x}) \right)^2 \right] \quad (5.93)$$

L ist ein *Funktional* der lokalen Magnetisierung

Berachte: ohne Coarse Graining ist $\Lambda^{-1} = a$, Blockspin=Spin

Insgesamt sollten Resultate des Coarse Graining nur schwach von Λ abhängen, solange (5.89) erfüllt ist

5.6 Interpretation der Landau freien Energie

Landau freie Energie $\neq$ Gibbs freie Energie, weil

- a) $G(M)$ ist konvex, $L(M)$ ist nicht konvex
- b) $G(M)$ ist thermodynamische Funktion;
 $L = L(M(\mathbf{x}))$, lokale Magnetisierung ist mikroskopische Information
 $\Rightarrow$ keine thermodynamische Funktion

Bisher rein phänomenologisch; Zusammenhang mit Zustandssumme/Hamiltonian?

$$Z = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta\mathcal{H}} \quad (5.94)$$

Coarse Graining = Mittelung in 2 Schritten:

- 1. $M_\Lambda(\mathbf{x})$ gemittelt innerhalb eines Blocks
- 2. M gemittelt über Blockspins

Sei für ein Λ^{-1} eine bestimmte Verteilung für $M_\Lambda(\mathbf{x}) = \bar{M}_\Lambda(\mathbf{x})$ vorgegeben:

$\{\bar{s}_i\}$: Spinkonfigurationen, die auf $\bar{M}_\Lambda(\mathbf{x})$ führen
 $\{s_i^*\}$: Spinkonfigurationen, die nicht auf $\bar{M}_\Lambda(\mathbf{x})$ führen

$$Z = \sum_{\{s_i^*\}} \sum_{\{\bar{s}_i\}} e^{-\beta\mathcal{H}} \equiv \sum_{\{s_i^*\}} e^{-\beta\mathcal{H}_{\text{eff}}(\bar{M}_\Lambda(\mathbf{x}))} \quad (5.95)$$

mit

$$e^{-\beta\mathcal{H}_{\text{eff}}(\bar{M}_\Lambda(\mathbf{x}))} = \sum_{\{\bar{s}_i\}} e^{-\beta\mathcal{H}} = \sum_{s_i} e^{-\beta\mathcal{H}} \delta\left(\sum_{i \in \Lambda^{-d}(\mathbf{x})} s_i - \bar{M}_\Lambda\right) \quad (5.96)$$

D.h. $\mathcal{H}_{\text{eff}}$ enthält eine *teilweise* Summation der Zustandssumme

Beachte: Summe über $\{s_i^*\}$, für die $M_\Lambda(\mathbf{x}) \neq \bar{M}_\Lambda$, entspricht Summe über alle möglichen Werte $\bar{M}_\Lambda$

Schreibe:

$$Z = \int DM_\Lambda(\mathbf{x}) e^{-\beta\mathcal{H}_{\text{eff}}(M_\Lambda(\mathbf{x}))} \quad (5.97)$$

Verallgemeinerung auf beliebige Ordnungsparameter η :

$$Z = \int D\eta_\Lambda(\mathbf{x}) e^{-\beta\mathcal{H}_{\text{eff}}(\eta_\Lambda(\mathbf{x}))}, \quad D\eta_\Lambda(\mathbf{x}) = \mathcal{N} \prod_{\mathbf{x}} d\eta_\Lambda(\mathbf{x}) \quad (5.98)$$

Dies ist ein Funktionalintegral

Approximative Auswertung:

Integral dominiert durch Minimum von $\mathcal{H}_{\text{eff}} \Rightarrow$ Sattelpunktmethode

$$\left. \frac{\delta \mathcal{H}_{\text{eff}}}{\delta \eta_{\Lambda}(\mathbf{x})} \right|_{\bar{\eta}} = 0, \quad \left. \frac{\delta^2 \mathcal{H}_{\text{eff}}}{\delta \eta_{\Lambda}(\mathbf{x})^2} \right|_{\bar{\eta}} > 0, \quad \Rightarrow \quad \bar{\eta} = \text{const} = \text{Mean Field!} \quad (5.99)$$

$$\eta_{\Lambda}(\mathbf{x}) = \bar{\eta} + \delta \eta_{\Lambda}(\mathbf{x})$$

$\Rightarrow$ Identifiziere

$$\mathcal{H}_{\text{eff}}(\eta_{\Lambda}(\mathbf{x})) = L(\eta_{\Lambda}(\mathbf{x})) = \int d^d x \left[\mathcal{L}(\eta_{\Lambda}(\mathbf{x})) + \frac{\gamma}{2} (\nabla \eta_{\Lambda}(\mathbf{x}))^2 \right] \quad (5.100)$$

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = \mathcal{H}_{\text{eff}}(\bar{\eta}) + \left[\int d^d x d^d x' \eta_{\Lambda}(\mathbf{x}) \frac{\delta^2 \mathcal{H}_{\text{eff}}}{\delta \eta(\mathbf{x}) \delta \eta_{\Lambda}(\mathbf{x}')} \eta(\mathbf{x}') + \dots - \int d^d x H(\mathbf{x}) \delta \eta_{\Lambda}(\mathbf{x}) \right]$$

$$Z = e^{-\beta \mathcal{H}_{\text{eff}}(\bar{\eta})} \int D\eta_{\Lambda}(\mathbf{x}) e^{-\beta[\dots]}$$

$$\text{MF-Beitrag} \quad \text{Fluktuationsbeitrag} \quad (5.101)$$

- Die Landau freie Energie entspricht einer effektiven Hamiltonfunktion, erhalten durch Coarse Graining
- MFT entspricht der Sattelpunktnäherung der Zustandssumme
- Für $\Lambda \rightarrow \infty$ exakte Lösung (wenn alle Korrekturen mitgenommen werden)
- Im Folgenden Vereinfachung Notation: $\eta_{\Lambda} \rightarrow \eta$, UV-Cutoff implizit

Gibbs freie Energie in MFT:

$$\begin{aligned} G(H, T) &= \frac{1}{\beta} \mathcal{H}_{\text{eff}}(\bar{\eta}, 0) - \bar{\eta} H V \\ &= \frac{V}{\beta} \mathcal{L}(\bar{\eta}, 0) - \bar{\eta} H V \\ &= \frac{V}{\beta} \mathcal{L}(\bar{\eta}, 0) - H M \\ M &= -\frac{\partial G}{\partial H} \quad \checkmark \end{aligned} \quad (5.102)$$

5.7 Erinnerung Funktionalableitung:

$$\begin{aligned} \underline{\text{Def.:}} \quad \delta F[x] &= \int ds \frac{\delta F}{\delta x(s)} \delta x(s) \quad \text{in Analogie zu} \\ df &= \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \end{aligned}$$

Beispiele:

1.

$$\begin{aligned} F[x] &= x(a) = \int ds x(s) \delta(s-a) \\ \delta F &= \int ds \delta x(s) \delta(s-a) = \int ds \frac{\delta F}{\delta x(s)} \delta x(s) \\ \Rightarrow \frac{\delta x(a)}{\delta x(s)} &= \delta(s-a) \quad \text{Rechenregel für Physiker} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} F[x] &= \int ds f(s)x(s) \\ \delta F &= \int ds f(s)\delta x(s) \\ \frac{\delta F}{\delta x(s)} &= f(s) \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} F[x] &= \int ds \int dt f(s,t)x(s)x(t) \\ \delta F &= \int ds \int dt f(s,t) \left[\delta x(s)x(t) + x(s)\delta x(t) \right] \\ &= \int ds \int dt \left[f(s,t)x(t)\delta x(s) + f(t,s)x(t)\delta x(s) \right] \\ &= \int ds \int dt \left[f(s,t)x(t) + f(t,s)x(t) \right] \delta x(s) \\ \frac{\delta F}{\delta x(s)} &= \int dt x(t) \{ f(s,t) + f(t,s) \} \end{aligned}$$

"Taylor-Formel: $F[x] = \sum_{u=0}^{\infty} \frac{1}{u!} \int ds_1 \dots \int ds_u F^{(u)}(s_1, \dots, s_u) x(s_1) \dots x(s_u)$

5.8 Fluktuationen und Korrelationen

Sei $\mathcal{H}_0$ die Hamiltonfunktion ohne äußeres Feld, lineare Kopplung,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 - \int d^d x H(\mathbf{x})\eta(\mathbf{x}), \quad Z(H) = \text{Tr} e^{-\beta\mathcal{H}} \quad (5.103)$$

$$\begin{aligned} \langle \eta(\mathbf{x}) \rangle &= \frac{\text{Tr} \eta(\mathbf{x}) e^{-\beta[\mathcal{H}_0 - \int d^d x' H(\mathbf{x}')\eta(\mathbf{x}')]}}{\text{Tr} e^{-\beta[\mathcal{H}_0 - \int d^d x' H(\mathbf{x}')\eta(\mathbf{x}')]}} \\ &= \frac{1}{\beta Z} \frac{\delta Z}{\delta H(\mathbf{x})} = \frac{1}{\beta} \frac{\delta \ln Z}{\delta H(\mathbf{x})} \\ &= -\frac{\delta F}{\delta H(\mathbf{x})} \end{aligned} \quad (5.104)$$

Verallgemeinerte isotherme Suszeptibilität:

$$\begin{aligned} \chi_T(\mathbf{x}, \mathbf{x}') &= \frac{\delta \langle \eta(\mathbf{x}) \rangle}{\delta H(\mathbf{x}')} \\ &= -\frac{\delta^2 F}{\delta H(\mathbf{x}') \delta H(\mathbf{x})} \\ &= \frac{1}{\beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\delta^2 Z}{\delta H(\mathbf{x}') \delta H(\mathbf{x})} - \frac{1}{Z^2} \frac{\delta Z}{\delta H(\mathbf{x})} \frac{\delta Z}{\delta H(\mathbf{x}')} \right) \\ &= \beta \left(\langle \eta(\mathbf{x}) \eta(\mathbf{x}') \rangle - \langle \eta(\mathbf{x}) \rangle \langle \eta(\mathbf{x}') \rangle \right) \\ &= \beta G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \end{aligned} \quad (5.105)$$

Mit Translationsinvarianz gilt: $G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') = T \chi_T(\mathbf{x} - \mathbf{x}')$

Fouriertrafo

$$\begin{aligned} G(\mathbf{x} - \mathbf{x}') &= \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} G(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \\ \chi_T(\mathbf{x} - \mathbf{x}') &= \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \chi_T(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \\ \Rightarrow \chi_T(\mathbf{k}) &= \beta G(\mathbf{k}) \end{aligned} \quad (5.106)$$

Statische Suszeptibilität:

$$\begin{aligned} \chi_T &\equiv \lim_{\mathbf{k} \rightarrow 0} \chi_T(\mathbf{k}) = \beta G(\mathbf{k})|_{\mathbf{k}=0} \\ &= \beta \int d^d x G(\mathbf{x}) \end{aligned} \quad (5.107)$$

5.9 Berechnung der Korrelationsfunktion

Beispielsystem:

$$L = \int d^d x \left[at\eta^2 + \frac{b}{2}\eta^4 + \frac{\gamma}{2}(\nabla\eta)^2 - H(\mathbf{x})\eta(\mathbf{x}) \right] \quad (5.108)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta} = 0 \quad \Rightarrow \quad -\gamma \nabla^2 \eta(\mathbf{x}) + 2at\eta(\mathbf{x}) + 2b\eta^3(\mathbf{x}) - H(\mathbf{x}) = 0 \quad (5.109)$$

Differenzieren nach H ergibt χ_T und damit die Korrelationsfunktion $G(\mathbf{x})$

$$\left[-\gamma \nabla^2 + 2at + 6b\eta^2 \right] \chi_T(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad (5.110)$$

$$\beta \left[-\gamma \nabla^2 + 2at + 6b\eta^2 \right] G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \quad (5.111)$$

Inhomogene partielle Differentialgleichung mit Punktquelle
 $\Rightarrow G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ ist Green-Funktion!

Für $t > 0$ sei $\eta = 0$ und

$$(-\nabla^2 + \xi_{>}^{-2})G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{\beta\gamma} \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \quad \xi_{>} \equiv \left(\frac{\gamma}{2at} \right)^{1/2} \quad (5.112)$$

Für $t < 0$ ist $\eta = \pm \sqrt{-at/b}$ und

$$(-\nabla^2 + \xi_{<}^{-2})G(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \frac{1}{\beta\gamma} \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}'), \quad \xi_{<} \equiv \left(-\frac{\gamma}{4at} \right)^{1/2} \quad (5.113)$$

ξ hat Dimension Länge und entspricht der Korrelationslänge:

$$\xi \sim t^{-\nu} \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{1}{2} \quad (5.114)$$

Setze $\mathbf{x}' = 0$ (beliebig), Lösung der Dgl. in Polarkoordinaten

$$\left[-\frac{1}{r^{d-1}} \frac{\partial}{\partial r} r^{d-1} \frac{\partial}{\partial r} + \xi^{-2} \right] G(r) = \frac{1}{\beta\gamma} \delta(r) \quad (5.115)$$

Umschreiben auf dimensionslose Variablen $\rho = r/\xi$, $\delta(\rho\xi) = \xi^{-d}\delta(\rho)$:

$$\left(-\frac{1}{\rho^{d-1}} \frac{\partial}{\partial \rho} \rho^{d-1} \frac{\partial}{\partial \rho} + 1 \right) G(\rho) = \frac{1}{\beta\gamma} \xi^{2-d} \delta(\rho) \quad (5.116)$$

Lösung durch modifizierte Bessel-Fkt. 3. Art, $K_n(\rho)$:

$$\frac{\beta\gamma}{\xi^{2-d}} G(\rho) = \begin{cases} e^{-\rho} & d = 1 \\ (2\pi)^{-d/2} \rho^{-(d-2)/2} K_{(d-2)/2}(\rho) & d \geq 2 \end{cases} \quad (5.117)$$

Asymptotische Eigenschaften:

$$K_n(\rho) \sim \begin{cases} \left(\frac{\pi}{2\rho}\right)^{-1/2} e^{-\rho}, & \rho \rightarrow \infty \\ \frac{\Gamma(n)}{2} \left(\frac{\rho}{2}\right)^{-n}, & \rho \rightarrow 0 \\ K_0(\rho) \sim \ln \rho, & \rho \rightarrow 0 \end{cases} \quad (5.118)$$

Gamma-Funktion:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} dt t^{x-1} e^{-t} \quad (5.119)$$

Für $T \neq T_c$ und $r \gg \xi$ findet man damit in $d \geq 2$

$$G(r) = \frac{\pi^{(1-d)/2}}{2^{(1+d)/2}} \frac{T}{\gamma} \frac{e^{-r/\xi}}{r^{(d-2)/2}} \frac{1}{\xi^{(d-3)/2}} \quad (5.120)$$

Exponentieller Abfall der Korrelationen außerhalb der Korrelationslänge

Für $T = T_c$ ist $\xi = \infty$ und daher $r \ll \xi$, so dass für $d > 2$

$$G(r) = \frac{T}{\gamma} \frac{\Gamma(\frac{d-2}{2})}{4\pi^{d/2}} \frac{1}{r^{d-2}} \quad (5.121)$$

Abfall der Korrelation mit Potenzgesetz!

5.10 Gültigkeit der Landau-Theorie: Ginzburg-Kriterium

Landau-Theorie vernachlässigt langreichweitige Fluktuationen/Korrelationen

Selbstkonsistenz der Theorie? (Hier Ising-Universalitätsklasse)

Beispiel Ising-Modell in MFT:

$$\sum_i s_i \sum_{j=1}^{\gamma} \left(\langle s_j \rangle + (s_j - \langle s_j \rangle) \right) \longrightarrow \sum_{\langle i,j \rangle} s_i \langle s_j \rangle \quad (5.122)$$

Diese Näherung ist äquivalent zu

$$s_i s_j \longrightarrow s_i \langle s_j \rangle, \quad \langle s_i s_j \rangle \longrightarrow \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle \quad (5.123)$$

Die Näherung ist demnach gut falls

$$\frac{\langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle}{\langle s_i \rangle \langle s_j \rangle} \ll 1 \quad (5.124)$$

Für allgemeine Systeme:

$$\frac{G(R)}{\bar{\eta}^2} \ll 1, \quad R \sim \xi : \text{effektive WW-Reichweite} \quad (5.125)$$

Mitteln über eine Korrelationslänge

$$\frac{|\int_V d^d x G(\mathbf{x})|}{\int_V d^d x \eta^2(\mathbf{x})}, \quad V = \xi(T)^d \quad (5.126)$$

Jetzt Beispielsystem Ising-Modell, vgl. Abschnitt 5.4.1:

$$\eta^2 = \frac{a}{b} |t|, \quad \chi_T = \frac{1}{4a|t|}$$

Nenner für $t < 0$:

$$\frac{a|t|}{b} \xi^d(t) = \frac{a}{b} \xi(1)^d |t|^{1-d/2} \quad (5.127)$$

Zähler: Wg. exponentiellem Abfall trägt Region $r > \xi(T)$ wenig zum Integral bei:

$$\int_V d^d x G(\mathbf{x}) \approx T \chi_T = \frac{T}{4a|t|} \quad (5.128)$$

Insgesamt benötigen wir

$$\frac{Tb}{4a^2 \xi(1)^d} \frac{1}{|t|^{2-d/2}} \ll 1 \quad (5.129)$$

Bei Annäherung an kritischen Punkt, $t \rightarrow 0$:

- $d > 4$: Ginzburg-Kriterium immer erfüllt, korrekte kritische Exponenten
- $d < 4$: Ginzburg-Kriterium *nicht* erfüllt, Physik nicht korrekt erfasst
- $d = 4$: Logarithmische Korrekturen zur Landau-Theorie, z.B.

$$\chi_T \sim \frac{1}{t} |\ln t|^{1/3} \quad (5.130)$$

- Landau-Theorie besser, je schwächer η^4 -Term gegen η^2 -Term

Verallgemeinerung auf andere Universalitätsklassen:

$$\begin{aligned} \int_V d^d x G(\mathbf{x}) &\sim T \chi_T \sim |t|^{-\gamma} \\ \int_V d^d x \eta^2(\mathbf{x}) &\sim \xi^d |t|^{2\beta} \sim t^{2\beta - \nu d} \end{aligned} \quad (5.131)$$

Unter Vernachlässigung aller Vorfaktoren $\sim O(1)$

$$|t|^{-\gamma} \ll |t|^{2\beta - \nu d} \quad \Rightarrow \quad d > \frac{2\beta + \gamma}{\nu} \equiv d_c \quad (5.132)$$

d_c heißt obere kritische Dimension:

Landau-Theorie ergibt das richtige Verhalten für $d > d_c$

Beispiel: Trikritische Exponenten aus Abschnitt 5.4.3:

$$\beta = \frac{1}{4}, \quad \nu = \frac{1}{2}, \quad \gamma = 1 \quad \Rightarrow \quad d_c = 3 \quad (5.133)$$

Für trikritische Punkte ergibt Landau-Theorie bis auf logarithmische Korrekturen das korrekte Verhalten!

5.11 Funktionalintegrale

Einzig analytisch integrierbarer Integraltyp: Gauß-Integrale der Form

$$I(A, B) = \int D\eta e^{-\frac{1}{2}(\eta, A\eta) + (B, \eta)} \quad (5.134)$$

Notation Skalarprodukt:

$$\begin{aligned} \text{diskret} \quad (A, B) &= \sum_i A_i B_i \\ \text{kontinuierlich} \quad (A, B) &= \int d^d x A(\mathbf{x}) B(\mathbf{x}) \\ \text{Fourierraum} \quad (A, B) &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} A(-\mathbf{k}) B(\mathbf{k}) \end{aligned} \quad (5.135)$$

Gaußintegral über $\mathbb{R}$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\frac{a}{2}x^2 + bx} = \sqrt{\frac{2\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{2a}}, \quad a > 0 \quad (5.136)$$

Jetzt Ausdehnung auf $\mathbb{R}^n$, diskreter Fall:

Sei $x \in \mathbb{R}^n$, $A = (A_{ij})$ $i, j = 1, \dots, n$, A reell, symmetrisch mit Eigenwerten $\lambda_i \neq 0, \text{Re}\lambda_i \geq 0$

$$(x, Ax) = \sum_{i,j} x_i A_{ij} x_j \quad (5.137)$$

Nun betrachte n -dimensionales Gaußintegral

$$I = \int d^n x e^{-\frac{1}{2}(x, Ax) + (B, x)} \quad (5.138)$$

$\Rightarrow$ Berechnung: zerlege in Fluktuationen um Minimum des Exponenten

$$\frac{d}{dx_k} \left(+\frac{1}{2} x_i A_{ij} x_j - B_i x_i \right) = 0 \quad (5.139)$$

$$\frac{1}{2} A_{kj} x_j + \frac{1}{2} x_i A_{ik} - B_k = 0 \quad (5.140)$$

$$A_{jk}^{-1} \mid A_{ki} x_i = B_k \quad (5.141)$$

$$\Rightarrow \bar{x}_j = A_{jk}^{-1} B_k \quad (5.142)$$

$$\text{Allgemeines } x: \quad x_i = A_{ij}^{-1} B_j + y_i \quad (5.143)$$

$$d^n x = d^n y \quad (5.144)$$

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{2}(x, Ax) + (B, x) &= -\frac{1}{2}(A_{ik}^{-1} B_k + y_i) A_{ij} (A_{jl}^{-1} B_l + y_j) + B_i (A_{ik}^{-1} B_k + y_i) \\
&= -\frac{1}{2}(A_{ik}^{-1} B_k B_i + B_k y_k + y_i B_i + y_i A_{ij} y_j) + B_i A_{ik}^{-1} B_k + B_i y_i \\
&= \frac{1}{2} B_i A_{ij}^{-1} B_j - \frac{1}{2} y_i A_{ij} y_j \\
&= \frac{1}{2} (B, A^{-1} B) - \frac{1}{2} (y, Ay) \tag{5.145}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I = \exp \frac{1}{2} (B, A^{-1} B) \int d^n y \exp -\frac{1}{2} (y, Ay) \tag{5.146}$$

Mit $A = A^{1/2} A^{1/2}$ (Wurzel der Matrix definiert über Diagonalform und Eigenwerte)

Variablentrafo:

$$y'_i = A_{ij}^{1/2} y_j, \quad \prod_i dy_i = \left| \frac{(dy_1 \dots dy_n)}{(dy'_1 \dots dy'_n)} \right| \prod_i dy'_i = (\det A^{1/2})^{-1} \prod_i dy'_i \tag{5.147}$$

$$\begin{aligned}
&\int dy^n \exp -\frac{1}{2} (y, Ay) \\
&= (\det A^{1/2})^{-1} \int d^n y' e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n y'_i y'_i} \\
&= (\det A)^{-1/2} (2\pi)^{\frac{n}{2}} \tag{5.148}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow I = \int d^n x e^{-\frac{1}{2}(x, Ax) + (B, x)} = (2\pi)^{\frac{n}{2}} (\det A)^{-\frac{1}{2}} \exp \frac{1}{2} (B, A^{-1} B) \tag{5.149}$$

Kontinuierliche Funktionalintegrale: Lösung im Fourierraum

$$\begin{aligned}
 \eta(\mathbf{x}) &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}, |\mathbf{k}| < \Lambda} \eta(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} && \text{(diskrete } \mathbf{k} \text{ für endliches } V) \\
 \eta(\mathbf{k}) &= \int_V d^d x \eta(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \\
 \delta^d(\mathbf{x} - \mathbf{x}') &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')} \\
 V \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} &= \int_V d^d r e^{-i(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot \mathbf{x}} \\
 \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} &\rightarrow \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} && \text{im Limes } V \rightarrow \infty \\
 \int D\eta &= \mathcal{N} \int \prod_{\mathbf{k}, |\mathbf{k}| < \Lambda} d\text{Re}(\eta(\mathbf{k})) d\text{Im}(\eta(\mathbf{k})) \\
 &= \mathcal{N}' \int \prod_{\mathbf{k}, |\mathbf{k}| < \Lambda} d\eta(\mathbf{k}) d\eta^*(\mathbf{k}) && (5.150)
 \end{aligned}$$

Für reelles $\eta(\mathbf{x})$: $\eta(\mathbf{k}) = \eta^*(-\mathbf{k}) \quad \Rightarrow \quad$ Integration nur über halben k -Raum,
z.B. $k_z > 0$

5.12 Landau freie Energie aus der Hamiltonfunktion

Betrachte das Ising-Modell in d Dimensionen:

$$\begin{aligned}
 \frac{\mathcal{H}}{T} &= -K \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i \\
 &\equiv - \sum_{i,j} \frac{1}{2} s_i J_{ij} s_j - \sum_i H_i s_i \\
 &= -\frac{1}{2}(s, Js) - (H, s)
 \end{aligned} \tag{5.151}$$

mit

$$\begin{aligned}
 s &= (s_1, s_2, \dots, s_N) \\
 J_{ij} &= \begin{cases} 2K & \text{falls } i, j \text{ nächste Nachbarn} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \\
 H_i &= h
 \end{aligned} \tag{5.152}$$

Mit Gauß-Integral (5.134): setze $A^{-1} = J, B = s$

$$e^{\frac{1}{2}(s, Js)} = I(J^{-1}, s)(\det J^{-1})^{1/2} \mathcal{N} \tag{5.153}$$

$$\begin{aligned}
 Z &= \sum_{(s)} e^{(s, Js) + (H, s)} \\
 &= \mathcal{N} \sum_{(s)} \left[(\det J)^{-1/2} \int D\eta e^{-\frac{1}{2}(\eta, J^{-1}\eta) + (s, \eta)} \right] e^{(H, s)} \\
 &= \mathcal{N} (\det J)^{-1/2} \int D\eta e^{-\frac{1}{2}(\eta, J^{-1}\eta)} \sum_{(s)} e^{(s, \eta + H)} \\
 &\stackrel{\phi \rightarrow \phi - H}{=} \mathcal{N} (\det J)^{-1/2} \int D\eta e^{-\frac{1}{2}(\eta - H, J^{-1}(\eta - H))} \sum_{(s)} e^{(s, \eta)}
 \end{aligned} \tag{5.154}$$

Dies hat die gewünschte Form

$$Z = \mathcal{N} \int D\phi e^{-L(\phi, H)} \tag{5.155}$$

Normierungsfaktor $\mathcal{N}$ fällt aus Erwartungswerten heraus

$$\begin{aligned}
 L(\phi, H) &= \frac{1}{2} \left((\phi - H, J^{-1}(\phi - H)) \right) - F(\phi) \\
 F(\phi) &= \ln \sum_{(s)} e^{(s, \phi)}
 \end{aligned} \tag{5.156}$$

Anmerkung: geht immer, wenn die Hamiltonfunktion in die Form

$$\frac{\mathcal{H}}{T} = -\frac{1}{2}(s, Js) - (H, s)$$

gebracht werden kann

Im Ising-Modell ist

$$\begin{aligned} \sum_{(s)} e^{(s, \phi)} &= \sum_{(s)} e^{s_1 \phi_1 + \dots + s_N \phi_N} = \prod_{i=1}^N (2 \cosh \phi_i) \\ \Rightarrow F(\phi) &= N \ln 2 + \sum_{i=1}^N \ln(\cosh \phi_i) \end{aligned} \quad (5.157)$$

5.13 Das Gauß-Modell oder die Gauß-Näherung

Landau freie Energie hat nur Terme quadratisch in η
bzw. höhere Terme werden vernachlässigt

$$L = \int d^d x \left(-\frac{\gamma}{2} \eta(\mathbf{x}) \nabla^2 \nabla^2 \eta(\mathbf{x}) + t a \eta^2(\mathbf{x}) + \dots - \eta(\mathbf{x}) h(\mathbf{x}) \right) \quad (5.158)$$

$\Rightarrow$ Z exakt lösbar, $A = -\gamma \nabla^2 + 2at$

$$Z = \mathcal{N} (\det A)^{-1/2} e^{\frac{1}{2} (h, A^{-1} h)} \quad (5.159)$$

Achtung: gültig nur für $at > 0, t > 0$

Damit lässt sich die erste Fluktuationskorrektur zu MFT berechnen, vgl. (5.101)

Eigenwerte von A :

$$\begin{aligned} (-\gamma \nabla^2 + 2at) f(\mathbf{x}) &= \lambda f(\mathbf{x}), & f(\mathbf{x}) &= e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \\ (\gamma \mathbf{k}^2 + 2at) &= \lambda_{\mathbf{k}} \\ \det A &= \prod_{\mathbf{k}} (\gamma \mathbf{k}^2 + 2at) \end{aligned} \quad (5.160)$$

$$\begin{aligned} (h, A^{-1} h) &= \int d^d x h(\mathbf{x}) (-\gamma \nabla^2 + 2at)^{-1} h(\mathbf{x}) \\ &= \int d^d x \frac{1}{V^2} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} h(\mathbf{k}) h(\mathbf{k}') (\gamma \mathbf{k}^2 + 2at)^{-1} e^{i(\mathbf{k} + \mathbf{k}') \cdot \mathbf{x}} \\ &= \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} \frac{h(\mathbf{k}) h(-\mathbf{k})}{\gamma \mathbf{k}^2 + 2at} \end{aligned} \quad (5.161)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \ln Z &= -\frac{1}{2} \ln \det A + \frac{1}{2} (h, A^{-1} h) + \ln \mathcal{N} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}} \ln(\gamma \mathbf{k}^2 + 2at) + \frac{1}{2V} \sum_{\mathbf{k}} \frac{h(\mathbf{k}) h^*(\mathbf{k})}{\gamma \mathbf{k}^2 + 2at} + \ln \mathcal{N} \end{aligned} \quad (5.162)$$

Betrachte $h = 0$:

$$Z = e^{-F/T} \quad (5.163)$$

Freie Energie (Gibbs, bis auf eine Konstante):

$$F = \frac{T}{2} V \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \ln(\gamma \mathbf{k}^2 + 2at) + d(T) V \quad (5.164)$$

$d(T)$ variiert kontinuierlich, analytisch, kein Beitrag zum singulären Teil der freien Energie

Kritische Exponenten:

$$\frac{C}{V} = -T \frac{\partial^2(F/V)}{\partial T^2} \quad (5.165)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial T V} &= -\frac{1}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \ln(\gamma \mathbf{k}^2 + 2at) + \frac{T}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{2a}{\gamma \mathbf{k}^2 + 2at} \frac{1}{T_c} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial T^2 V} &= \frac{1}{2T_c} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{2a}{\gamma \mathbf{k}^2 + 2at} + \frac{1}{2T_c} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{2a}{\gamma \mathbf{k}^2 + 2at} \\ &\quad - \frac{T}{2T_c^2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{4a^2}{(\gamma \mathbf{k}^2 + 2at)^2} \\ \frac{C}{V} &= -\frac{T}{2T_c} 4a \underbrace{\int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{\gamma \mathbf{k}^2 + 2at}}_{=I_1} + \frac{1}{2} \frac{T^2}{T_c^2} 4a^2 \underbrace{\int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\gamma \mathbf{k}^2 + 2at)^2}}_{=I_2} \end{aligned} \quad (5.166)$$

$$I_2 = \int_{-\Lambda}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\gamma \mathbf{k}^2 + 2at)^2} = \frac{1}{4a^2 t^2} \int_{-\Lambda}^{\Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{\left(\frac{\gamma \mathbf{k}^2}{2at} + 1\right)^2} \quad (5.167)$$

$$\text{Substitution: } \mathbf{q} = \left(\frac{\gamma}{2at}\right)^{1/2} \mathbf{k} = \xi \mathbf{k} \quad \text{vgl.} \quad (5.168)$$

$$I_2 = \frac{\xi^{4-d}}{\gamma^2} \int_{-\xi\Lambda}^{\xi\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2 + 1)^2} \quad (5.169)$$

Wir interessieren uns für $t \rightarrow 0^+$, $\xi\Lambda \rightarrow \infty$, konvergiert das Integral?

Zähle Potenzen von q :

$$\begin{aligned} d^d q &\sim q^{d-1} dq \\ \frac{q^{d-1}}{(1+q^2)^2} &\rightarrow \begin{cases} 0 & q \rightarrow 0, d > 1 \\ q^{d-5} & q \rightarrow \infty \end{cases} \end{aligned} \quad (5.170)$$

Untere Grenze konvergent für $d > 1$

Obere Grenze: $I_1 \sim \int dq q^{d-5}$, konvergent für $d-5 < -1$ oder $d < 4$

$$I_1 = \xi^{4-d} \times \text{Zahl} \rightarrow \infty \quad \text{für } t \rightarrow 0 \quad (5.171)$$

$\xi \rightarrow \infty \Leftrightarrow k = q/\xi \rightarrow 0$ Infrarotdivergenz im ursprünglichen Integral

Der Ursprung dieser Divergenz ist physikalisch $\Rightarrow$ Phasenübergang!

$$\sim t^{-(2-d/2)} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 2 - \frac{d}{2} \quad (5.172)$$

Jetzt betrachte $d > 4$, I_2 vor Reskalierung, $t \rightarrow 0$:

$$I_2 \sim \frac{1}{\gamma^2} \int_0^\Lambda \frac{dk k^{d-1}}{k^4} < \infty \quad \text{für} \quad d-1-4 > -1 \quad (5.173)$$

Endlich im IR! (aber nicht im UV für $\Lambda \rightarrow \infty$)

$\Rightarrow$ kein Beitrag zu singulärem Verhalten von C/V , d.h. keine Korrekturen zu MFT für $d > 4$ ✓

Analog:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-\Lambda}^\Lambda \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\gamma \mathbf{k}^2 + 2at)} = \frac{1}{\gamma} \int_{-\Lambda}^\Lambda \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{\xi^{-2} + k^2} \\ &= \frac{\xi^{2-d}}{\gamma} \int_{-\xi\Lambda}^{\xi\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{(q^2 + 1)} \end{aligned} \quad (5.174)$$

Zähle Potenzen von q :

$$\begin{aligned} d^d q &\sim q^{d-1} dq \\ \frac{q^{d-1}}{1+q^2} &\rightarrow \begin{cases} 0 & q \rightarrow 0, d > 1 \\ q^{d-3} & q \rightarrow \infty \end{cases} \end{aligned} \quad (5.175)$$

$\xi \rightarrow \infty$: Reskaliertes Integral konvergent für $d-3 < -1$, oder $d < 2$

$$\Rightarrow I_1 \sim \xi^{2-d} \sim t^{-(1-d/2)} \quad (5.176)$$

Beachte: IR-Divergenz schwächer als derjenige von I_2 , kein Beitrag zum führenden singulären Verhalten

Für $d > 2$ betrachte wieder unskaliertes Integral für $t \rightarrow 0$

$$I_1 \sim \int_0^\Lambda \frac{dk k^{d-1}}{k^2} \quad (5.177)$$

Endlich an der Untergrenze, kein Beitrag zu singulärem Verhalten

Insgesamt:

$$C \sim \begin{cases} t^{-2(2-d/2)} & d < 4 \\ \text{endlich} & d > 4 \end{cases} \quad (5.178)$$

Dies ergibt eine Korrektur des kritischen Exponenten α verglichen mit MFT, alle anderen unverändert

$$\alpha = 2 - \frac{d}{2} \quad (5.179)$$

Weitere Korrekturen durch η^4 -Term, in der Gauß-Näherung vernachlässigt; nicht mehr analytisch berechenbar!

6 Die Renormierungsgruppe

Kritisches Verhalten verursacht durch Fluktuationen mit langen Wellenlängen

⇒ Beschreibung durch Coarse Graining mit $\Lambda^{-1} \rightarrow \xi$

6.1 Blockspin-Transformationen

Betrachte Ising-Modell:

$$\frac{\mathcal{H}}{T} = -K \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i, \quad K = J/T, h = H/T \quad (6.1)$$

Zustandssumme für N Spins:

$$Z_N(h, t) = e^{-\frac{N}{T} f(h, t)} \quad (6.2)$$

Unterteile Gitter in Blocks der Größe b^d , mit Indizes $I, J, \dots$

Mittlere Magnetisierung im Block I :

$$\bar{m}_b = \frac{1}{b^d} \sum_{i \in I} \langle s_i \rangle \quad (6.3)$$

Def. Blockspin:

$$s_I = \frac{1}{m_b} \frac{1}{b^d} \sum_{i \in I} s_i = \pm 1 \quad (6.4)$$

Danach Reskalierung:

$$\begin{aligned} \text{Anzahl der Blockspins : } N_b &= b^{-d} N \\ \text{Gitterabstand : } a_b &= b a \end{aligned} \quad (6.5)$$

Annahme 1: Wie die ursprünglichen Spins haben auch die Blockspins nur WW mit nächsten Nachbarn

Kopplung + Feld: K_b, h_b mit $K_1 = K, h_1 = h$

Effektiver Hamiltonian:

$$\frac{\mathcal{H}}{T} = -K_b \sum_{\langle I, J \rangle} s_I s_J - h_b \sum_I s_I \quad (6.6)$$

Achtung: die Längeneinheit (Gitterabstand) wurde verändert, Physik unverändert!

Beispiel Korrelationslänge:

$$\xi_b \underbrace{a_b}_{ab} \stackrel{!}{=} \xi a, \quad \Rightarrow \quad \xi_b = \frac{\xi}{b} \quad (6.7)$$

Die Korrelationslänge in Einheiten des Gitterabstandes ist auf dem geblockten Gitter kürzer verglichen mit dem ursprünglichen Gitter

Ähnlich für effektives Feld:

$$h \sum_i s_i = h \sum_I \sum_{i \in I} s_i = h b^d m_b \sum_I s_I = h_b \sum_I s_I \quad (6.8)$$

$$\Rightarrow h_b = h b^d m_b \approx h b^d \bar{m}_b \quad (6.9)$$

Für gleiche Physik muss gelten:

$$Z_{N_b}(h_b, t_b) = e^{-\frac{N_b}{T} f(h_b, t_b)} \stackrel{!}{=} Z_N(h, t) \quad (6.10)$$

$$\Rightarrow \frac{N_b}{T} f(h_b, t_b) = \frac{N}{T} b^{-d} f(h_b, t_b) = \frac{N}{T} f(h, t) \quad (6.11)$$

Für die freie Energie gilt dann

$$N b^{-d} f_s(t_b, h_b) = N f_s(h, t) \quad (6.12)$$

Wie transformieren h, t ?

Annahme 2:

$$t_b = t b^{D_t}, \quad h_b = h b^{D_h}, \quad D_t, D_h > 0 \quad (6.13)$$

Dann ist

$$b^{-d} f(h_b, t_b) = f(h, t) \quad (6.14)$$

$\Rightarrow$ Skalenverhalten folgt aus Blockspintransformationen!

Problem: Annahme 1 ist sicher *nicht* gültig (z.B. induzierte "diagonale" WW)

$\Rightarrow$ der erste Blockspin-Hamiltonian hat andere Form als der ursprüngliche

Universalität: Nach Iteration von Blockspintrafos müssen die Hamiltonians von Systemen in einer Universalitätsklasse alle dieselbe Form haben!