

## Mathematische Methoden der Physik für das Lehramt L3 – Blatt 3

---

### Aufgabe 1 [6 Punkte]: Berechnen von Ableitungen

Bestimmen Sie für die folgenden Funktionen  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  den maximalen Definitionsbereich  $D \subseteq \mathbb{R}$  und berechnen Sie deren Ableitungen.

- (a)  $f(x) = (x^2)^{-1/3}$ , [2 Punkte]
  - (b)  $f(x) = (x^4 - 1)/(x^2 - 1)$ , [2 Punkte]
  - (c)  $f(x) = \arctan(x^2)$ . [2 Punkte]
- 

### Aufgabe 2 [10 Punkte]: Hyperbelfunktionen

Die Hyperbelfunktionen sind durch

$$\sinh x = \frac{\exp x - \exp(-x)}{2}, \quad \cosh x = \frac{\exp x + \exp(-x)}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} \quad (1)$$

definiert. Sie heißen „sinus hyperbolicus“, „cosinus hyperbolicus“ und „tangens hyperbolicus“.

- (a) Bestimmen Sie den Definitionsbereich  $D \subseteq \mathbb{R}$  der drei Hyperbelfunktionen und berechnen Sie deren Ableitungen. [2 Punkte]
- (b) Zeigen Sie, dass
$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad (2)$$
gilt. [2 Punkte]
- (c) Die Umkehrfunktionen der Hyperbelfunktionen heißen arcosh, arsinh und artanh. Dabei ist arcosh :  $[1, \infty] \rightarrow [0, \infty]$ . Berechnen Sie die Ableitungen mit Hilfe der Formel von der Ableitung der Umkehrfunktion. [3 Punkte]
- (d) Drücken Sie arsinh, arcosh und artanh mit Hilfe des ln aus und bestätigen Sie die in der vorigen Teilaufgabe gefundenen Ableitungsformeln. [3 Punkte]