

Übungen zur Theoretischen Physik 2 für das Lehramt L3 – Blatt 11

Aufgabe 1: Faltungssatz für Fourier-Transformationen

Wir betrachten die Fourier-Transformation und ihre Umkehrung für zeitabhängige Funktionen, die durch

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\omega) &= \int_{\mathbb{R}} dt f(t) \exp(i\omega t), \\ f(t) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{f}(\omega) \exp(-i\omega t) \end{aligned} \quad (1)$$

gegeben sind.

Die Faltung zweier Funktionen f und g im Zeitbereich ist durch

$$h(t) = f * g(t) = \int_{\mathbb{R}} dt' f(t-t')g(t') \quad (2)$$

definiert. Zeigen Sie, dass für die Fourier-Transformierten dieser Funktionen

$$\tilde{h}(\omega) = \widetilde{f * g}(\omega) = \tilde{f}(\omega)\tilde{g}(\omega) \quad (3)$$

gilt.

Tip: Bei der Rechnung ist die Formel

$$\int_{\mathbb{R}} dt \exp(-i\omega t) = 2\pi \delta(\omega) \quad (4)$$

nützlich.

Aufgabe 2: Fourier-Darstellung elektromagnetischer Wellen

Es seien die Ladungs- und Stromverteilung durch ihre Fourier-Darstellung bzgl. der Zeit

$$\begin{aligned} \rho(t, \vec{x}) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{\rho}(\omega, \vec{x}) \exp(-i\omega t), \\ \vec{j}(t, \vec{x}) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{d\omega}{2\pi} \vec{j}(\omega, \vec{x}) \exp(-i\omega t), \end{aligned} \quad (5)$$

gegeben.

- (a) Berechnen Sie die Fourier-Transformierte der retardierten Green-Funktion

$$D_{\text{ret}}(t, \vec{x}) = \frac{1}{4\pi r} \delta\left(t - \frac{r}{c}\right) \quad \text{mit} \quad r = |\vec{x}| \quad (6)$$

des D'Alembert-Operators und interpretieren Sie das Resultat physikalisch.

- (b) Bestimmen Sie mit Hilfe des Faltungssatzes aus der vorigen Aufgabe die Fourier-Transformierten der retardierten Lösungen der Maxwell-Gleichungen für die Potentiale in Lorenz-Eichung

$$\begin{aligned}\Phi(t, \vec{x}) &= \frac{1}{\epsilon_0} \int_{\mathbb{R}} dt' \int_{\mathbb{R}^3} d^3x' D_{\text{ret}}(t-t', \vec{x}-\vec{x}') \rho(t', \vec{x}'), \\ \vec{A}(t, \vec{x}) &= \mu_0 \int_{\mathbb{R}} dt' \int_{\mathbb{R}^3} d^3x' D_{\text{ret}}(t-t', \vec{x}-\vec{x}') \vec{j}(t', \vec{x}')\end{aligned}\quad (7)$$

Wir nehmen dabei an, dass die Ladungen und Ströme für $|\vec{x}| = r > R$, also außerhalb einer Kugel vom Radius R um den Ursprung verschwinden. Geben Sie die einfachste Näherung für das „Fernfeld“ bei $r \gg R$ an.

- (c) Berechnen Sie die Fourier-Transformierten der Felder, die wegen $\vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi - \partial_t\vec{A}$ und $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ durch

$$\vec{\tilde{E}}(\omega, \vec{x}) = -\vec{\nabla}\tilde{\Phi}(\omega, \vec{x}) + i\omega\vec{\tilde{A}}(\omega, \vec{x}), \quad \vec{\tilde{B}}(\omega, \vec{x}) = \vec{\nabla} \times \vec{\tilde{A}}(\omega, \vec{x}) \quad (8)$$

gegeben sind.

Behalten Sie auch hier wieder nur die führende Ordnung $\mathcal{O}(1/r)$ in Potenzen von $1/r$ („Fernfelder“) bei.