

# THEORETISCHE PHYSIK 3 - KLASISCHE ELEKTRODYNAMIK

WISE 2025 / 2026 – PROF. MARC WAGNER

---

MICHAEL EICHBERG: eichberg@itp.uni-frankfurt.de  
VILIJA DE JONGE: dejonge@itp.uni-frankfurt.de

## Aufgabenblatt 6

Abgabe am 28.11.2025, Besprechung in der Woche vom 01.12.2025.

### Aufgabe 1 [Penning-Falle]

(1+1+3=5 Pkt.)

Mit einer Penning-Falle können elektrisch geladene Teilchen mit Hilfe eines elektromagnetischen Feldes gefangen gehalten werden, d.h. sie bewegen sich aufgrund der auf sie wirkenden elektromagnetischen Kraft nur in einem begrenzten Raumgebiet. Im Folgenden soll nur das elektrische Feld einer Penning-Falle betrachtet werden,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \alpha(x, y, -2z) \quad (1)$$

( $\alpha = \text{const}$ ).

- (i) Berechne die  $z$ -Komponente der Trajektorie eines elektrisch geladenen Teilchens (Ladung  $q > 0$ ) in diesem elektrischen Feld und zeige damit, dass  $z(t)$  beschränkt ist, dass das Teilchen also in  $z$ -Richtung eingesperrt ist.  
*Anmerkung: Um ein Einsperren in  $x$ - und  $y$ -Richtung zu gewährleisten, ist das hier nicht betrachtete magnetische Feld erforderlich.*
- (ii) Bestimme das zu  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  gehörige elektrostatische Potential  $\Phi(\mathbf{r})$ .
- (iii) Das elektrische Feld einer Penning-Falle kann mit drei relativ zueinander isolierten gekrümmten Metallplatten realisiert werden, an denen die konstanten Potentiale  $\Phi_1$ ,  $\Phi_2$  und  $\Phi_3$  anliegen. Bestimme mathematische Ausdrücke, die die Form der Metallplatten beschreiben und fertige eine entsprechende Skizze an. Wie müssen die Potentiale  $\Phi_1$ ,  $\Phi_2$  und  $\Phi_3$  gewählt werden, damit das oben angegebene  $\mathbf{E}(\mathbf{r})$  erzeugt wird und die Falle in  $z$ -Richtung einen Mindestdurchmesser von  $d$  hat?

### Aufgabe 2 [Fourier-Reihe]

(3 Pkt.)

Berechne die Fourier-Reihe der im Intervall  $0 \leq x \leq L$  definierten Funktion

$$f(x) = \begin{cases} f_0 = \text{const}, & \text{falls } L/4 \leq x \leq 3L/4, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases} \quad (2)$$

d.h. bestimme die Koeffizienten  $A_n$  in der Darstellung

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} A_n e^{+2\pi i n x / L}. \quad (3)$$

*Optional:* Plotte die Darstellung von  $f(x)$ , wobei Du die Summe abschneidest, d.h. nur von  $-N$  bis  $+N$  laufen lässt, für  $N = 0, 1, 2, 3$ .

**Aufgabe 3** [Orthonormalität und Vollständigkeit komplexer Exponentialfunktionen] (3+2+1=6 Pkt.)

Betrachte das Funktionensystem

$$g^{(n)}(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{+2\pi i n x / L} \quad (4)$$

mit Definitionsbereich  $x \in [0, L]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$ .

- (i) Zeige, dass es sich um ein orthonormales Funktionensystem handelt.
- (ii) Mache plausibel, dass das Funktionensystem vollständig ist. Gehe dabei wie folgt vor:

(a) Betrachte zunächst die Vektoren

$$g_j^{(n)} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{+2\pi i n j / N}, \quad (5)$$

$j, n = 0, 1, \dots, N - 1$  und zeige, dass

$$\sum_{n=0}^{N-1} (g_j^{(n)})^* g_k^{(n)} = \frac{N}{L} \delta_{jk} \quad (6)$$

gilt.

- (b) Ersetze  $(j/N)L \rightarrow x$  und  $(k/N)L \rightarrow y$ , bilde den Limes  $N \rightarrow \infty$  und schließe aus Deinen Ergebnissen auf die Vollständigkeit des Funktionensystems  $g^{(n)}$ .

**Aufgabe 4** [Kreisförmige Randwertprobleme] (2+4=6 Pkt.)

In der Vorlesung wurde die allgemeine Lösung der 2-dimensionalen Laplace-Gleichung in Polarkoordinaten hergeleitet,

$$\Phi(r, \varphi) = \frac{A_0}{\sqrt{2\pi}} + B_0 \frac{\ln(r/r_0)}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n \neq 0} \left( A_n r^{|n|} + B_n \frac{1}{r^{|n|}} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{+in\varphi}. \quad (7)$$

Betrachte nun die beiden folgenden Randwertprobleme:

- (1) Das Volumen  $\mathcal{V}$  ist der gesamte 2-dimensionale Raum bis auf einen im Ursprung zentrierten Kreis mit Radius  $R$ .  
Dirichlet-Randbedingungen  $\Phi(r = R, \varphi) = \Phi_0(\varphi) = \alpha \cos(2\varphi)$  und  $\Phi(r \rightarrow \infty) = 0$ .
- (2) Das Volumen  $\mathcal{V}$  ist ein im Ursprung zentrierter Kreisring, innerer Radius  $R_1$ , äußerer Radius  $R_2$ .  
Dirichlet-Randbedingungen  $\Phi(r = R_1, \varphi) = \Phi_1(\varphi) = \beta + \gamma \cos(\varphi)$  und  $\Phi(r = R_2, \varphi) = \Phi_2(\varphi) = \delta \sin(3\varphi)$ .

Löse die folgenden Aufgaben für beide Randwertprobleme:

- (i) Müssen einige der unbekannten Koeffizienten  $A_n$  und  $B_n$  aus offensichtlichen Gründen verschwinden? Falls ja, welche?

- (ii) Gib für alle verbleibenden Koeffizienten  $A_n$  und  $B_n$  Integralausdrücke an, so dass die vorgegebenen Randbedingungen erfüllt werden, und berechne diese. Gib damit die Lösung  $\Phi(r, \varphi)$  des Randwertproblems an.